



4-72

PLEASE DO NOT REMOVE  
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

---

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

---

RS	Ch'ên, Shih-wên
125	T'ai p'ing hui min ho chi
C48	chü fang
1874	
v.4-6	


East Asia



和劑局方

六卷至八卷

黃



RS  
125  
c48  
1874  
V.4-6



增廣太平惠民和劑局方卷六

**積熱**

療脚氣毒遍內外煩熱不解口中生瘡狂易叫走  
瘴疫毒癘卒死溫瘧五尸五疰心腹諸疾疔刺切痛及  
解諸熱藥毒發邪熱卒黃等并解蠱毒鬼魅野道熱毒  
及治小兒驚癇百病

石膏

黃金

一百片與藥  
煮過不用

寒水石

磁石

滑石

已上四味各三斤搗碎水一  
斛煮至四斗去滓人下頂

易方卷六 積熱

續鮑叔書

犀角屑

羚羊角屑

青木香

搗碎

沉香

搗碎各五兩

元參

洗焙搗碎

升麻

各一斤

甘草

剉炒八兩

丁香

搗碎

已上八味入前藥汁中再煮取一斗五升去滓入下項

朴硝

精者十斤

消石

四升如關芒硝亦得每升重七兩七錢半

已上二味入前藥汁中微火上煎柳木棍攪不住手候有七升投在木盆中半日欲凝入下藥

麝香

當門子

朱砂

飛研三兩

已上二味入前藥中攪調令勻安之二日

右件藥成霜雪紫色每服一錢或二錢用冷水調下大人小兒臨時以意加減食後服

紅雪通中散治煩熱黃疸脚氣溫瘴解酒毒消宿食開



三焦利五臟爽精神除毒熱破積滯去腦悶治眼昏頭痛鼻塞口瘡重舌腸癰喉閉及傷寒狂躁胃爛發癰等病並宜服之

赤芍藥

人參去蘆

檳榔

枳殼去穰炒黃

淡竹葉

甘草生用

木香各二兩

羚羊角屑

升麻

黃芩各三兩

梔子去皮

葛根

桑白皮

木通

大青去根

藍葉各一兩半

川朴硝

十斤

蘇枋六兩

朱砂細研一兩

麝香細研半兩

右藥除硃砂麝香外並細剉以水二斗五升煎至九升去滓更以綿濾過再以緩火煎令微沸然後

司方卷六 積熱

二 生積飽 積書



下朴硝以柳木篋攪勿住手候凝次下硃砂麝香  
等末攪令勻傾新瓷盆中經宿即成矣細研每服  
一錢至二錢新汲水調下更量老小虛實臨時加  
減服凡服靈寶丹者先依上件服法調此藥服訖  
須臾更以熱茶投令宜瀉一兩  
行為度後服靈寶丹立有效

**牙痛散**治大人小兒臟腑積熱煩躁多渴面熱頭昏唇

焦咽燥舌腫喉閉目赤鼻衄頰頰結硬口舌生瘡痰實  
不利涕唾稠粘睡臥不寧譫語狂妄腸胃躁澀便秘  
結一切風壅並宜服之

川大黃

朴硝

甘草

各二兩

山梔子

仁

薄荷葉

去梗

黃芩

各十兩

連翹

二斤

右爲釐末每二錢水一盞入竹葉七片蜜少許煎至七分去滓食後溫服小兒可服半錢更隨歲數加減服之得利下住服

**澁心散**治風壅壯熱頭目昏痛肩背拘急肢節煩疼熱

氣上衝口苦唇焦咽喉腫痛痰涎壅滯涕唾稠粘心神

煩躁眼澀睛疼及寒壅不調鼻塞聲重咽乾多渴五心

煩熱小便赤澁大便秘滯並宜服之

白朮一兩半

麻黃和節

當歸去苗洗

荊芥穗

芍藥

甘草燭

大黃

麴裏煨去麴切焙各六兩

右爲細末每服二錢水一盞入生薑薄荷各少許同煎至七分溫服如小兒熱痘瘡疹欲發先狂語

司方卷六

積熱

三

續鮑最書



多渴及驚風積熱可服一錢並臨卧服如大人五臟壅實欲要澹轉加至四五錢乘熱服

**八正散**治大人小兒心經邪熱一切蘊毒咽乾口燥大

渴引飲心忪面熱煩躁不寧面目赤睛疼唇焦鼻衄口舌生瘡咽喉腫痛又治小便赤澀或癰閉不通及熱淋血淋並宜服之

車前子 瞿麥 扁蓄 滑石

山梔仁 甘草 木通 大黃麴裏煨去麴切各一斤

右爲散每服二錢水一盞入燈心煎七分去滓溫服食後臨卧小兒量力少少與之

**龍膽散**治大人小兒蘊積邪熱咽喉腫痛赤眼口瘡



心煩鼻衄咽乾多渴卧寐不寧及除痰熱咳嗽中暑煩躁一切風壅並宜服之

縮砂仁

瓜蒌根

各三兩

甘草

蜜炒十兩

石膏

四十兩研

藿香葉

一斤半

大梔子

仁微炒二十兩

右爲末每服一錢至二錢用新汲水入蜜調下又治傷寒餘毒潮熱虛汗用藥二錢水一盞入竹葉五六片煎至七分溫服並食後服

**砂**

治丈夫婦人小兒諸疾

辰砂

飛研九兩

牛黃

龍腦

膩粉

研

麝香

研各三兩

金箔

九十片研

巴豆

三百一十粒去心腹炒研細

蜀方卷六 積熱

四

續鮑林取書

右合研勻煉黃蠟六兩入白沙蜜三分同煉令勻  
爲圓每兩作三十圓如治潮熱積熱傷寒結胸發  
黃狂走燥熱口乾面赤大小便不通煎大黃炙甘  
草湯下一圓毒利下血煎黃連湯調膩粉少許如  
患酒毒食毒茶毒氣毒風痰伏痞吐逆等並用膩  
粉龍腦米飲下中毒吐血悶亂煩躁欲死者用生  
人血下立愈小兒百病驚癇急慢驚風涎潮搐搦  
用龍腦膩粉蜜湯下萊豆大二圓諸積食積熱煩  
赤煩躁睡臥不寧驚哭瀉利並用金銀薄荷湯下  
更量歲數加減如大人及婦人因病傷寒時疾陰  
陽氣交結伏毒氣胃中乾躁眼赤潮熱不定再經  
日數七八日已下至半月日未安醫所不明證候  
脈息交亂者可服一圓或分作三圓亦可並用龍  
腦膩粉米飲調半盞已來下此一服取轉下一切  
惡毒涎並藥圓瀉下如要却收水洗淨以油單紙  
裹埋入地中五日取出可再與大人小兒依法服  
一圓救三人卽不堪使如要藥速行卽用  
針刺一眼子冷水浸少時服之卽效更速

龍腦雞蘇圓

除煩解勞消穀下氣散胸中鬱熱主肺熱

欬嗽治鼻衄吐血崩下血血淋熱淋勞淋氣淋止消

渴除驚悸涼上膈解酒毒又治胃熱口臭肺熱喉腥脾

疸口甜腎疸口苦常服聰耳明目開心益智

雞蘇

淨葉一斤即龍腦薄荷也

麥門冬

四兩湯洗去心焙乾

生乾地黃末

六兩後入膏

真蒲黃

微炒

阿膠

炒微燥

真銀州柴胡

劉同木通以沸湯大半升浸一二宿絞取汁後入藥

人參

各二兩

木通

劉同柴胡浸各二兩

黃耆

去蘆一兩

甘草

炙一兩半

右除別研藥後入外並為末好蜜二斤先煉一二沸然後下生乾地黃末不住手攪時時入絞下者

司方卷六 積熱

五續 龍腦雞蘇



木通柴胡汁慢慢熬成膏勿令焦然後將其餘藥末同和為圓如豌豆大每服二十圓嚼破熱水下不嚼亦得虛勞煩熱消渴驚悸煎人參湯下咳嗽唾血鼻衄吐血麥門冬子湯浸去心煎湯下並食後臨卧服惟血崩下血諸淋疾皆空心食前服治淋用車前子湯下

**治風壅痰實蘊積不散頭痛面赤心煩潮**

躁痰涎壅塞咽膈不利精神恍惚睡卧不安口乾多渴

唇焦咽痛頷頰赤腫口舌生瘡

紫英石

研飛

麝香

研

龍腦

各五兩餅

牛黃

一兩一分研

寒水石粉

又

牙硝

枯過研細

石膏

研細各二十兩

甘草

盤十兩

天南星

七兩半

牛胆製

右為末煉蜜圓每兩作三十圓每一圓溫薄荷人參湯嚼食後服小兒常服半圓治急驚一圓並用薄荷湯化下

**治風壅痰實頭目昏眩胸膈煩悶心神不寧恍**

**惚驚悸痰涎壅塞及治中暑煩渴陽毒狂躁**

天南星

牛膽製十六兩

阿膠

碎炒如珠三兩

牛黃

半兩

白石英

飛

辰砂

研

生犀角

麝香

研

藿香葉

各二兩

雄黃

研飛四兩

金箔

銀箔

研各五十片

**治大人小兒風壅痰熱心膈煩躁夜卧不安譫**

右為細末入研藥令勻用溫湯澉和為圓如雞頭實大每服一圓用新汲水化破入鹽少許食後服

語狂妄目赤鼻衄口燥咽乾療中暑解熱毒

鉛白霜

龍腦各三分

甘草

炙一兩

牙硝

枯過三兩

寒水石粉

三十兩

右爲末糯米糊圓如彈子大每服用生薑蜜水磨下半圓新汲水亦得小兒一圓分五服食後

**紹興續方**

**甘露飲**治丈夫婦人小兒胃中客熱牙宣口氣齒齦腫爛時出膿血目臉垂重常欲合閉或卽肌煩不欲飲食及目赤腫痛不任涼藥口苦生瘡咽喉腫痛瘡疹已發未發皆可服之又療脾胃受濕瘵熱在裏或醉飽房勞



濕熱相搏致生疽病身面皆黃肢體微腫胸滿氣短大便不調小便黃澁或時身熱並宜服之

熟乾地黄

麥門冬

去心焙

枳殼

去穢麩炒

甘草

炙

山茵陳

枇杷葉

刷去毛淨

石斛

去蘆

黃芩

生乾地黄

天門冬

去心焙

桂枝圓消暑圓

治證并方見傷寒中暑類

寶慶新傳方

五淋散

治腎氣不足膀胱有熱水道不通淋瀝不宜出

司方卷六 積熱

七

續鮑散書

少起多臍腹急痛蓄作有時勞倦即發或尿如豆汁或如砂石或冷淋如膏或熱淋便血並治之

又方見後

赤茯苓

六兩

當歸

去蘆

甘草

生用各五兩

山梔子仁

赤芍藥

去蘆剉各二十兩

右為細末每服二錢水一盞煎至八分空心食前服

**消毒麻仁圓**

治諸般風氣上壅久積熱毒痰涎結實胸

膈不利頭旋目暈或因酒麪炙燂毒食所傷停留心肺浸清腸胃蘊蓄不散久則內鬱血熱腸風五痔外則發瘡瘍癰疽赤斑遊腫渾身躁悶面上瘡赤口乾舌裂咽

喉澁痛消中引飲或傷寒時變口鼻出血煩燥者及風毒下疳瘡腫疼痛脚氣衝心悶亂一切風熱毒氣並皆主之

生大黃

五兩

山梔子

仁十兩

生杏仁

二兩去皮尖

右三味煉蜜爲圓每服三十圓至五十圓夜臥溫湯吞下利下赤毒膠涎爲效服時隨意加減此爲甚穩善不損臟腑常服搜風順氣解毒治小兒驚熱以蜜湯化下三五圓極效

**厚祿新方**

**導赤散**

治大人小兒心經內虛邪熱相乘煩躁悶亂傳

流下經小便赤澁淋漓臍下滿痛

局方卷六 積熱

續鮑 蘇書



生乾地黃

甘草

生用

木通

各等分

右咬咀每三錢水一盞竹葉少許煎六分溫服不拘時

吳圓閣增諸家名方

三黃圓治丈夫婦人三焦積熱上焦有熱攻衝眼目赤

腫頭項腫痛口舌生瘡中焦有熱心膈煩躁不美飲食

下焦有熱小便赤澀大便秘結五臟俱熱即生瘡癰瘡

痰及治五般痔疾糞門腫痛或下鮮血

黃連

去蘆

黃芩

去蘆

大黃

煨各十兩

右為末煉蜜為圓如梧桐子大每三十圓熱水下如臟腑壅實加服圓數小兒積熱亦宜服之

**消毒犀角飲** 治大人小兒內蘊邪熱咽膈不利痰涎壅

嗽眼赤臉腫腮項結核癰腫毒聚遍身風癰癰毒赤癰  
及瘡癰已出未出不能快透並皆治療小兒疹痘欲出  
及已出熱未解急進此藥三四服快透消毒應手神效

**鼠粘子**

六十兩

**荆芥穗**

**甘草**

炙各十兩

**防風**

去苗八兩

右爲篩末每服三錢水一盞煎至七分去滓食後溫服

**治一切積熱咽喉腫痛口舌生瘡心中煩躁嚙物**

**煩悶或喉閉壅塞水漿不下天行時疫發狂昏憤並皆**

司方卷六 積熱

九續鮑林取書

治之

寒水石

研飛

芒硝

石膏

煨研飛

青黛

馬牙硝

朴硝

消石

甘草

各等分

右將甘草煎湯二升去滓却入諸藥再煎用柳木  
篋不住手攪令消鎔得所却入青黛和勻傾入砂  
盆內候冷結凝成霜研為末每用少許含化嚙津  
不拘時候如喉閉壅塞不能嚙物者用小竹筒吹  
藥入喉中  
頻用神效

**勝水丹**

治三焦壅盛上衝頭目赤熱疼痛口舌生瘡咽

喉不利嚙物有礙神思昏悶並皆治之

白藥子

一兩半

山豆根

黃連

甘草

炙



黃藥子

紅內消

各二兩

麝香

研

龍腦

研各二錢

右爲末用建盞盛于飯上蒸候冷次入腦麝令勻煉蜜圓如雞頭大每一圓含化又用津唾於指甲上磨少許點赤眼立效

治心腎凝滯膀胱有熱小便不通風熱相搏淋瀝不宣或服補藥過多水道塞澁出少起數臍腹急痛攻疰陰間或心肺壅熱面赤心忪口乾煩渴及癰腫發背血脈瘀閉服此排膿內消腫毒疏導心經邪熱及內蘊風熱五般淋疾並皆治之

山梔子仁 炒一十兩

芍藥

赤者

茯苓

去皮各四兩

司方卷六

積熱

十

積熱

積熱

生乾地黄

焙

木通

去節各半斤

大黃

炒十兩

滑石

四兩

右爲細末煉蜜爲圓如梧桐子大每服二十圓至三十圓食後溫熱水吞下

**五淋散** 治證與前五淋散同

山梔仁

炒十兩

淡竹葉

四兩

芍藥

赤者

茯苓

去皮各半斤

山茵陳

去根二兩

木通

去節

甘草

炙

滑石

各六兩

右爲末每服三錢水一盞煎至八分空心服

**麥門冬散** 治丈夫婦人蘊積邪熱心胸煩悶咽乾口燥

睡卧不安或大小腸不利口舌生瘡並皆治之

芒消

兩

麥門冬

去心三分

小草

黃連

去鬚

升麻去麤皮

犀角屑

甘草炙

黃芩

枳殼去穰麤炒

大青各半兩

右爲末每服三錢水一盞煎至七分食後溫服

**眞珠散** 治丈夫婦人五臟積熱毒氣上攻心胸煩悶口

乾舌燥精神恍惚心忪悶亂坐臥不寧並宜服之

眞珠粉

琥珀

寒水石

火煨醋淬

牙硝

研枯

瓜萆根末

鐵粉

甘草末

生用

硃砂

研飛

川大黃

右等分各爲末拌勻每服

一錢以竹葉湯溫調下

積熱

**上**

續鮑蘇取書



**靈丹** 治一切風熱臟腑積熱毒氣上攻胸膈煩躁口

舌乾澀心神壅悶咽隘不利飲食無味

寒水石 火煨 研飛 石膏 研 瓜蒌根 烏梅 去核 炒

赤茯苓 去木 葛根 各一兩 麥門冬 一兩 半 龍腦 別研 錢

右將麥門冬去心訖並為末入研藥令勻煉蜜圓如彈子大每服一圓薄絹裏含化嚙津

**瀉痢 附秘澀**

**鍾乳建脾圓** 治男子婦人虛損羸瘦身體沉重脾胃冷

弱飲食不消腹脹雷鳴泄痢不止又治腸虛積冷下痢

清穀或下純白腹中疴痛及久痢赤白腸滑不禁少氣

羸困不思飲食並宜服之

鍾乳粉

三兩

當歸

去蘆

龍骨

神麴

碎炒

赤石脂

煨

黃連

去鬚

人參

去蘆

細辛

去苗土

大麥蘖

炒

乾薑

炮

茯苓

去皮

石斛

去根

肉桂

去麤皮

附子

炮去皮

蜀椒

去目及閉口者微炒出汗六兩

右爲末入鍾乳粉勻煉蜜爲圓如梧桐子大每服三十圓溫米飲下食前日三服

**朝真丹**

治腸胃虛弱內受風冷或飲食生冷內傷脾胃

泄瀉暴下日夜無度腸鳴腹痛手足厥冷

硫黃

生研細

白礬

煨七兩半

硃砂

三兩一錢研爲衣

局方

積熱

瀉痢

三續

鮑

祛取

老目

右各研勻用水浸蒸餅為圓如梧桐子大以前硃砂為衣每服三十圓溫米飲下不計時候夏月宜備急

**圓**治一切下痢無問新久及冷熱膿血腸滑裏急

日夜無度臍腹絞痛不可忍者

黃連

去鬚三兩

乾薑

炮製十兩

阿膠

搗碎炒如珠子為末以醋四升熬成膏

當歸

十五兩

右為末阿膠膏和併手圓如梧桐子大每服三十圓食前溫米飲下日三服凡小兒服圓如麻子大加減量歲數

**阿膠勒圓**治腸胃虛弱內受風冷水穀不化泄瀉注下



腹痛腸鳴胸滿短氣又治腸胃積寒久痢純白或有青  
黑日夜無度及脾胃傷冷暴泄不止手足厥冷脈微欲  
絕

肉豆寇

去皮

木香

不見火

乾薑

炮各二兩

縮砂仁

訶黎勒皮

川烏頭

炮去皮臍

白礬

煅各四兩

龍骨

洗

赤石脂

各八兩

右為末用粟米飯為圓如梧桐子大每服二十圓至三十圓溫粟米飲下食前甚者可倍加圓數服

**大瀉圓**

治脾胃虛弱冷氣攻衝飲食不化心腹脹痛

嘔吐吞酸痞噎不通腸鳴泄痢水穀不分面黃肌瘦食

司方卷六

黃熱

瀉痢

三

續鮑叢書

減嗜卧常服温脾益胃消穀進食久虛痼冷食少傷多

宜常服

吳茱萸湯洗七次大麥蘖炒肉桂去麤皮各五兩附子炮去皮臍

細辛去苗各二兩枳殼麤炒一分半神麴碎炒三兩人參去蘆

乾薑炮甘草炙桔梗各三兩

右為細末煉蜜和圓如梧桐子大每服十圓温酒或米飲下日三服空心食前

**黃連阿膠圓**治腸胃氣虛冷熱不調下痢赤白狀如魚

腦裏急後重臍腹疼痛口燥煩渴小便不利

阿膠碎炒一兩茯苓去皮二兩黃連去鬚三兩

右黃連茯苓同為末水調阿膠未搜和圓如梧桐子大每服二十圓溫米飲下食前服

**神效胡粉圓** 治腸胃虛滑下痢無度赤白相雜臍腹痛

痛裏急後重減食羸瘦或經久未差並宜服之

烏賊魚骨

洗

阿膠

炒焦如珠子

胡粉

各四兩

蜜佗僧

二十兩

白礬

枯過

龍骨

洗各八兩

右為末以粟米飯為圓如梧桐子大每服二十圓至三十圓溫粟米飲空心下

**桃花圓** 治腸胃虛弱冷氣乘之臍腹攪痛下痢純白或

冷熱相搏赤白相雜腸滑不禁日夜無度

赤石脂

乾薑

炮各等分

同方卷六 積熱

瀉痢

古

續鮑叢書



右為末水麪糊為圓如梧桐子大每服三十圓溫米飲下空心食前日三服

**治臟腑怯弱** 有積滯臍腹撮痛下痢膿血日

夜無度裏急後重腸鳴腹脹水穀不化少氣困倦不思

飲食或發寒熱漸至羸瘦

桂府滑石 乳香 研各一分 黃丹 研

枯礬 研各一兩半

信州砒霜 消石 與砒霜一處研入磁罐子內用石灰蓋口炭火燒半日取出去火毒

膩粉 研 粉霜 研各半兩 硃砂 研飛一兩

右為末用蒸餅二兩四錢和為圓如梧桐子大每服五圓溫粟米飲下未愈加圓數再服小兒可服一圓至二圓隨大小臨時加減服之

**不圖** 治大人小兒一切瀉痢無問冷熱赤白連綿不

差愈而復發腹中疼痛者宜服之

**白膠香**

研細四兩 **砒霜** 一兩六錢研入磁罐子以赤石脂固縫鹽泥固濟燒通赤候冷取出

**木鱉子**

十箇燒焦 **乳香** 六錢半研

**黃丹**

二兩半炒

**黃蠟**

一兩三錢

**硃砂**

研飛半兩

**巴豆**

去皮心膜油

**杏仁**

去皮尖各七十箇研

右研勻鎔蠟和圓如黃米大每錢作一百二十圓每服一圓小兒半圓水瀉新汲水下赤痢甘草湯下白痢乾薑湯下赤白痢甘草乾薑湯下並放冷臨臥服忌熱物一兩時辰

**調製**

治脾胃虛弱內挾冷氣心脇臍腹脹滿刺痛

嘔吐惡心飲食減少腸鳴泄利水穀不化怠惰少力漸

方卷八

積熱

瀉痢

左

續鮑叢書

漸瘦弱並宜服

訶子皮

青皮

去穰各四十兩

附子

炮去皮臍十斤

肉桂

去麤皮五斤

肉豆蔻仁

麵裹煨令熟四十兩

右為末每服三錢水盞半生薑三片煎七分食前溫服

**木香散**

治脾胃虛弱內挾風冷泄瀉注下水穀不化臍

下疔痛腹中雷鳴胸膈痞悶脇肋虛脹及積寒久利腸

滑不禁肢體羸困不進飲食

肉豆蔻仁

當歸

去蘆

甘草

燼

木香

丁香

各二十兩

赤石脂

附子

去皮臍醋煮切片焙乾各十兩



訶子皮十五兩 藿香葉洗焙四兩

右爲末每服一大錢水一盞生薑二片棗一箇同煎至六分溫服空心食前

**神功圓** 治三焦氣壅心腹痞悶六腑風熱大便不通腰

腿疼痛肩背重疼頭昏面熱口苦咽乾心胸煩燥睡卧

不安及治脚氣并素有風人大便秘結燥

大麻仁

別搗如膏 人參去蘆各二兩

大黃

錦紋者麵裹煨 訶黎勒皮各四兩

右爲末入麻仁搗研勻煉蜜爲圓如梧桐子大每服二十圓溫水下溫酒米飲皆可食後臨卧如大便不通可倍圓數以利爲度

**麻仁圓** 順三焦和五臟潤腸胃除風氣治冷熱壅結津

局方卷六

積熱

瀉痢

去

續鮑叢書

液耗少令人大便秘難或閉塞不通若年高氣弱及有風人大便秘瀝尤宜服之

白檳榔 半生半煨 山茱萸 防風 去蘆 枳殼 去穰

兔絲子 酒浸 車前子 肉桂 去麤皮 山積 各一兩半

郁李仁 去皮 大黃 半生半蒸 麻仁 別搗研 羌活 去蘆

木香 各一兩

右為末入研藥勻煉蜜和圓如梧桐子大每服十五圓至二十圓溫水臨臥服

脾約麻仁圓治腸胃燥澀津液耗少大便堅硬或秘不通臍腹脹滿腰背拘急及有風人大便秘結躁又治小便

利數大便因硬而不渴者謂之脾約此藥主之

厚朴

去麤皮薑汁炒

枳實

麤炒

芍藥

各半斤

大黃

蒸焙一斤

麻黃

別研五兩

杏仁

去皮尖炒研五兩半

右為末蜜和圓如梧桐子大每服二十圓臨卧溫水下以大便秘利為度未利再服

治風氣壅盛痰熱結搏

頭目昏重涕唾稠黏心

煩面赤咽乾口燥精神不爽夜卧不安肩背拘急胸膈

痞悶腹脇脹滿重疼大便秘結小便赤澀及嵐瘴之地

最宜服

郁李仁

去皮

大黃

蒸焙各一兩

肉桂

去麤皮

羌活

去蘆

局方卷六

積熱

瀉痢

七

續鮑林取書



扁鵲方 秘酒

檳榔 生

木香 生

川芎 各半兩

右為末煉蜜溲和為圓如梧桐子大每服十五圓至二十圓溫熟水下食後臨卧服更量臟腑虛實加減服

**三圓** 療風氣結聚宿食不消兼砂石皮毛在腹中及

積年腰脚疼痛冷如冰石脚氣衝心煩憤悶亂頭旋暗  
創肩背重痛心腹脹滿胸膈閉塞風毒腫氣連及頭面  
大便或秘小便時澀脾胃氣痞不能飲食脚轉筋掣痛  
變急心神恍惚眠卧不安等疾

訶黎勒皮

柴胡 去苗洗

枳實 燼

木香 各五兩

桃仁

去皮尖  
熅六兩

大黃

麵裹煨  
十五兩

甘草

熅六兩

右為末煉蜜圓如梧桐子大每服二十圓米飲下  
食後臨卧服稍增至四五十圓取宜利為度覺病  
勢退服五補圓不問男女老少並宜服量虛實加減服

**七寶湯**

治脾胃虛弱內受寒氣泄瀉注下水穀不分腹

脇脹滿臍腹疔痛心下氣逆腹中虛鳴嘔吐惡心胃膈

痞悶困倦少力不思飲食

茴香

去土炒

川烏

炮去皮臍

縮砂

取仁各八兩

甘草

六兩

乾薑

炮四兩

厚朴

去皮薑製

益智

去皮各一斤

右為龕末每服二錢水一盞大棗七箇  
擘破同煎七分去滓溫服食前空心

司方卷六

瀉痢

大

續鮑林書

風寒治大人小兒風冷乘虛入客腸胃水穀不化泄瀉注下腹脇虛滿腸鳴疴痛及腸胃濕毒下如豆汁或下瘀血日夜無度並宜服

白芍藥 白朮 肉桂去麋皮 人參去蘆

當歸 芎藭 茯苓去皮各等分

右為龕末每服二錢水一大盞粟米百餘粒同煎七分去滓稍熱服空心小兒量力減之

牛黃丸除積冷煖元藏溫脾胃進飲食治心腹一切痞冷氣及年高風秘冷秘或泄瀉等並皆治之

硫黃明淨好者研令極細用柳木槌子絞過 半夏湯洗七次焙乾為末



右等分以生薑自然汁同熬入乾蒸餅末攪和勻  
入臼內杵數百下圓如梧桐子大每服空心溫酒  
或生薑湯下十五圓至  
二十圓婦人醋湯下

**赤石脂散**治腸胃虛弱水穀不化泄瀉注下腹中雷鳴

及冷熱不調下痢赤白腸滑腹痛通數頻多脇肋虛滿

胸膈痞悶肢體困倦飲食減少

縮砂仁

二十箇

赤石脂

甘草

各五兩

肉豆寇仁

麵裹煨令熟四十兩

右爲末每服二錢溫粟  
米飲下食前空心服

**紹興續添方**

局方卷六 積熱

瀉痢

九

續鮑叢書

純陽真人養臟湯治大人小兒腸胃虛弱冷熱不調臟

腑受寒下痢赤白或便膿血有如魚腦裏急後重臍腹  
疔痛日夜無度胸膈痞悶脇肋脹滿全不思食及治脫  
肛墜下酒毒便血諸藥不效者並治之

白芍藥

一兩

當歸

去蘆

人參

去蘆

白朮

各六錢

肉豆蔻

半兩

肉桂

去皮

甘草

炙各八錢

木香

一兩四錢

訶子皮

一兩

罌粟殼

去蒂益蜜炙三兩六錢

右爲麤末每服二大錢水一盞半煎八分去滓食  
前溫服老人孕婦小兒暴瀉急宜服之立愈忌酒  
麵生冷魚腥油膩如臟腑滑泄夜起久不瘥者可  
加炮了附子三四片煎服此藥的有神效不可具

述

**威應圓**

治證并方見一切氣類

**大已寒圓**

治證并方見傷寒類

**寶慶新條方**

**御米湯**

治久患痢疾或赤或白臍腹痛裏急後墜發

歇無時日夕無度及下血不已全不入食並治之

**罌粟殼**

蜜炙

**白茯苓**

去皮

**甘草**

炙各五兩

**人參**

去蘆

**乾薑**

炮各二兩半

**厚朴**

去麁皮薑汁炒十兩

右咬咀每服三錢水一盞半生薑三片大淮棗三枚烏梅一枚煎至一盞去滓空心食前通口服如年老及七八十歲每服二大錢小兒每服一錢半更量兒歲加減

局方卷六積熱

瀉痢

三

續鮑叔取書



**龍榆散** 治腸胃氣虛冷熱不調泄瀉不止或下鮮血或

如豆汁或如豚肝或膿血相雜赤多白少腹痛後重遍

數頻併全不入食並宜服之 又方見後

**罌粟殼** 去穢蜜炙 **石榴皮** **蓮蓬** 去莖 **甘草** 炒各兩等分

右為細末每服二大錢水一盞半生薑三片煎至一盞通口服不拘時候

**金粟湯** 治丈夫婦人室女小兒一切下痢無問新久冷

熱不調日夜無度臍腹絞痛即痢肢體困倦小便閉澀

不思飲食漸加羸瘦又治傷生冷脾胃怯弱飲食不消

腹脹雷鳴泄瀉不止連月不瘥並宜服之

罌粟殼

去穰 蜜炒

甘草

炒各半斤

陳皮

去白 雨一分

車前子

四兩 炒

乾薑

二兩 炮

右爲細末每服二大錢水一盞棗一枚生薑二片煎至七分空心食前稍熱服或用飯飲調下亦得忌生冷油膩魚腥鮮醬等物

**育腸圖**

治腸胃虛弱內挾生冷腹脹泄瀉時時刺痛裏

急後重下痢赤白或變膿血晝夜頻併經久不瘥

烏梅肉

黃連

去鬚梗 各一分

當歸

去蘆酒浸透 一宿焙一兩

肉豆蔻

濕紙裏煨

訶子皮

罌粟殼

去蓋筋蜜炙各半兩

右爲細末煉蜜圓如梧桐子大每服三十圓至五十圓空心食前飯飲下如小兒作小圓煎甘草乾

司方卷六 積熱

瀉痢

三

續鮑鼓書

薑湯下

**腸風聖散** 治榮衛氣虛風邪冷氣進襲臟腑之內或食

生冷或啖炙煇或飲酒過度積熱腸間致使腸胃虛弱  
糟粕不聚大便鮮血臍腹疼痛裏急後重或肛門脫出  
或久患酒痢大便頻併並皆治之

木饅頭

燒

敗椶

燒

烏梅

去核

甘草

炙各二兩

右為細末每服二錢水一盞煎至七分空心溫服

**斗門散**

治八種毒痢臟腑撮痛膿血赤白或有五色相

雜日夜頻併兼治禁口惡痢裏急後重大渴不止酒痢



臟腑全不進食

又方見後

罌粟殼

去穰蜜炙

黑豆

炒去殼各四兩

當歸

去蘆

乾薑

炮各一兩

地榆

去蘆

甘草

炙各二兩

乾葛

去皮半斤

右爲細末每服二錢水一盞煎至七分溫服不拘時候

**水香木香圓**

治一切赤白膿血相雜裏急後重或臟腑

滑泄日夜無度或積寒久冷臍腹疼痛不思飲食

又方見後

青皮

去白

甘草

炙各二兩四錢

罌粟殼

去穰二兩八錢

當歸

去蘆

訶子

煨去核

木香

不見火各六兩

右爲細末煉蜜圓如彈子大每服一圓水八分蓋煎至六分空心食前溫服

局方卷六積熱

瀉痢

三

續鮑林取書

厚貼新濟方

大斷下圓治臟腑停寒腸胃虛弱腹痛泄瀉全不思食

高良薑去蘆 赤石脂研 乾薑炮 龍骨研各一兩半

酸石榴皮去穢淨米醋浸一宿炙焦黃色 白礬枯 附子炮去皮臍

肉豆蔻麵裹煨 訶子炮去核 牡礪火煨各一兩 細辛去土葉七錢半

右為細末醋煮麪糊為圓如梧桐子大每服五十圓空心溫米飲下

狗頭骨圓治久患下痢臍腹痛所下雜色晝夜不止

或其人久虛頻下腸垢謂之惡痢並能治之

肉豆蔻麵裹煨 附子炮去皮臍 狗頭骨一具火燒存性取末各一兩

赤石脂

敗龜燒存性

乾薑各半兩

右爲末醋煮糊圓如梧桐子大每服五七十圓米飲空心下

吳山閣增諸家名方

水煮木香圓治證與前水煮木香圓同

白芍藥

當歸

去蘆各二兩

瞿粟殼

去蒂蓋蜜炒黃色八兩

陳橘皮

去白

青皮

去白

甘草

炒

木香

各一分

訶子皮

去核二兩半

右爲細末煉蜜圓每一兩作六圓每服一圓水一盞煮至七分和滓空心溫服不拘時亦得

大香連圓

治丈夫婦人腸胃虛弱冷熱不調泄瀉煩渴

司方卷六

積熱

瀉痢

三

續鮑散書



米穀不化腹脹腸鳴胸膈痞滿脇肋脹悶或下痢膿血  
裏急後重夜起頻併不思飲食或小便不利肢體倦怠  
漸即瘦弱

**木香**

四兩八錢

**黃連**

去蘆鬚二十兩用吳茱萸十兩同炒令赤去茱萸不用

右爲細末醋糊爲圓如梧桐子大每服二十圓飯飲吞下空心食前日進二三服

**以爲圓**治脾受濕氣泄痢不止米穀遲化臍腹刺痛小

兒有疳氣下痢亦能治之

**吳茱萸**

去梗炒

**黃連**

去鬚

**白芍藥**

各五兩

右爲細末麵糊爲圓如梧桐子大每服二十圓濃煎米飲下空心日三服

痢聖散子治丈夫婦人遠年近日赤白休息等痢

黃栢皮

去蘆皮

枳殼

去穰

甘草

燼

御米

即粳粟子

罌粟殼

去蒂蓋各四兩

乾薑

炮

當歸

去蘆二兩

右爲麤散每服三錢水一盞半薤白二條擘碎同煎八分去滓食前溫服老人小兒加減服食忌生

令油膩物

豆附圓

治丈夫婦人腸胃虛弱內受風冷水穀不化泄

瀉注下腹痛腸鳴手足厥冷服諸藥不效者此藥主之

肉豆蔻

炮

附子

炮去皮臍

茯苓

白者焙各四兩

木香

不見火

肉桂

去蘆皮

乾薑

炮各二兩

丁香

一兩不見火

司方卷六

積熱

瀉痢

岳

續鮑林取書

厚朴名之秘

右為細末薑汁麵糊為圓如梧桐子大每服五十  
圓至一百圓生薑湯下或粥飲亦得空心食前進  
**溫中圓**治脾臟傷冷宿食不消霍亂吐瀉心腹膨脹攻

刺

**良薑** 去蘆

**乾薑** 炮

**青皮** 去白

**陳皮** 去白各五兩

右為細末用醋打麵糊為圓如梧桐子大每服三十圓米飲下不拘時候又療丈夫小腸疝氣塊疔痛炒茴香少許嚼鹽湯或鹽酒任下日進二服

**內聖散**治脾胃氣虛腹脇脹滿水穀不消臟腑滑瀉

腹內虛鳴困倦少力口苦舌乾不思飲食日漸瘦弱

**訶子皮**

**川烏** 炮去皮臍

**肉桂** 去麁皮

**茴香** 炒各二兩

肉豆蔻

麵裹煨

厚朴

去麁皮薑炒

甘草

燼

乾薑

炮

陳橘皮

各四兩

蒼朮

米泔浸一宿去皮焙八兩

右爲末每服二錢水一盞薑二片棗一枚煎七分溫服

**神應聖藥**

治丈夫婦人久新腸風痔瘻着牀頭痛不

可忍者服此藥不過三四次便見功效初得此疾發痒或疼穀道周回多生硬核此是痔如破是瘻只下血是風皆因酒色氣風食五事過度卽成此疾人多以外醫塗治病在腸自有蟲若不去根本其病不除此藥的有神效

局方卷六 積熱

瀉痢

五

續鮑叢書



唐本卷之六 秘製

刺蝟皮

十六兩

猪懸蹄

一百隻

雷丸

脂麻

各四兩

牛角腮

十二兩

苦楝根

五兩

亂髮

皂角水  
洗焙

敗櫻

各八兩

槐角

六兩

右剉碎入瓷罐內燒存性研為末入乳香二兩麝香八錢研和勻用酒打麪為圓如梧桐子大每服八粒先細嚼胡桃一枚以溫酒吞下空心晚食前日二服如病甚日三服切忌別藥不過兩三日永除根本

**響栗湯**

治腸胃氣虛冷熱不調或飲食生冷內傷脾胃

或飲酒過度臍腹疼痛泄瀉腸鳴下痢或赤或白裏急後重日夜頻併飲食減少及腸胃受濕膨脹虛鳴下如

豆汁或下鮮血

罌粟殼去蒂蜜炙四兩

艾葉去梗

黑豆炒去皮

乾薑炮

陳皮去白

甘草炙各二兩

右為籩散每服三錢水一盞半煎至一盞去滓溫服食前忌生冷油膩毒物小兒量歲數加減與之

**固腸散**治脾胃虛弱內受寒氣泄瀉注下水穀不分冷

熱不調下痢膿血赤少白多或如魚腦腸滑腹痛遍數

頻併心腹脹滿食減少力

陳米炒二兩

肉豆蔻生用

罌粟殼去蒂蓋膜蜜炙各二兩

乾薑炮

甘草炙各二兩半

木香一兩不見火

司方卷六 積熱

瀉痢

三 續鮑 林取書

右為末每服二錢酒一盞生薑二片棗一枚同煎至七分溫服不計時如不飲酒水煎亦得忌酒麵魚腥等物

**麵木圓**治時暑暴瀉壯脾溫胃進美飲食及療飲食所傷胸膈痞悶

神麴炒

蒼朮米泔浸一宿焙乾

右各等分為細末麵糊為圓如梧桐子大每服三十圓不拘時米飲吞下

**金丹**治大人小兒一切瀉痢無問冷熱赤白連綿不癒愈而復發腹中疼痛者宜服之

白膠香一錢

黃蠟

硃砂各一兩

乳香

硃砂

各二錢半

木鱉

半兩

黃丹

二兩半

砒霜

三錢半醋煮燉

巴豆

去皮心膜出油

杏仁

去皮尖及雙仁者各八兩

右研爲末鎔蠟和圓如麻子大每服一圓若小兒半圓水瀉新汲水下赤痢甘草湯下白痢乾薑湯赤白痢甘草乾薑湯並放冷臨臥服孕婦莫服忌熱物一二時辰

**縛虎圓**治休息痢經一二年不瘥羸瘦衰弱及脾疼腰

痛

黃蠟

半兩

砒

成塊好者半兩研細

右將黃蠟鎔開下砒以柳條七箇逐箇攪頭焦卽換俟用足取起旋圓如梧桐子大每服一圓痢冷水下脾疼亦然腰痛冷酒下並食前小兒圓如黍米大每服一圓湯使同上

司方卷六 積熱

瀉痢

三

續鮑 鼓書



方名不秘

遇山立散 治諸般惡痢或赤或白或淡濃相雜裏急

後重臍腹絞痛或下五色或如魚腦日夜無度或禁口

不食不問大人小兒虛弱老人產婦並宜服之

御米殼去蒂蓋炒 川當歸去蘆 甘草各二兩 赤芍藥

酸榴皮 地榆各半兩

右為龕散每服三錢水一盞半煎至七分空心溫服小兒量歲數加減以瘥為度忌生冷油膩腥臊等物

三神圓 治清濁不分泄瀉注下或赤或白臍腹疔痛裏

急後重

草烏

三枚各去皮尖一  
生一炮一燒作灰

右爲細末醋糊圓如蘿蔔子大大人五七圓小兒  
三圓水瀉倒流水下赤痢甘草湯下白痢乾薑湯

續添諸局經驗秘方

世榆散

治大人小兒脾胃氣虛冷熱不調下痢膿血或

因腸胃乘虛爲熱毒所滲下痢純血臍腹痛裏急後  
重口燥煩渴小便不利純下鮮血或先經下痢不應服  
熱藥而誤服熱藥蘊毒不散積於腸間滲而成血者並  
宜服之

司方卷六

積熱

瀉痢

辰

續鮑叢書

赤芍藥

茯苓

去皮各六兩

地榆

炒

乾葛

各半斤

罌粟殼

蜜炒十二兩

當歸

去苗三兩

甘草

炙四兩

乾薑

炮二兩

右爲細末每服二錢用溫熱水調下不拘時候小兒三歲可服半錢更量歲數加減與之若下痢純白或下紫黑血腸滑不禁者不可服之

**秘傳斗門散**

治八種毒痢臟腑撮痛膿血赤白或下瘀

血或成片子或有五色相雜日夜頻併兼治禁口惡痢裏急後重久渴不止全不進食他藥不能治者立見神

效

罌粟殼

蜜炒半斤

地榆

炒

甘草

炙各六兩

白芍藥

三兩

乾薑

炮四兩

黑豆

炒去皮十二兩

右為細末每服二錢水一盞同煎至七分溫服

**丁香豆蔻散**

治脾胃虛弱宿寒停積或飲食生冷內傷

脾胃泄瀉注下水穀不化胃滿短氣嘔逆惡心臍腹痛脇肋脹滿腹內虛鳴飲食減少及積寒久痢純白或白多赤少日夜無度或脾胃虛寒泄瀉日久愈而復發者並宜服之

京三稜

炮

白茯苓

去皮

木香

不見火

乾薑

炮

司方卷六

積熱

瀉痢

元

續鮑林取書



肉豆蔻

炮

厚朴

去麁皮薑汁製

人參

去蘆

芍藥

各五兩

吳茱萸

湯洗七次

甘草

炙

丁香

各一兩半

蒼朮

去皮七兩

右爲細末每服三錢水一盞生薑三片棗一枚同煎至八分空心食前溫服如不及煎鹽少許湯點服亦可

**萬金飲**

治脾胃虛弱內受風寒或飲食生冷傷於脾胃

嘔吐瀉泄臍腹疴痛脇肋脹滿腸內虛鳴及腸胃受濕膿血相雜下如豆汁或下瘀血裏急後重日夜無度飲食減少漸至羸瘦並能治之

陳皮

去白

甘草

半生

罌粟殼

去蒂蓋半生半蜜炙各等分

右為龕末每服四錢先用沸湯泡蓋熱又於碗內盛重湯坐蓋在內却抄末藥在掌內用沸湯泡至七分蓋上用蓋蓋之良久紗綿濾去滓空心食前溫服

**如神生補丸**

治臟腑虛寒脾胃受濕泄瀉無度腸鳴腹

痛不進飲食漸至羸瘦並宜服之

**蒼朮**

米泔浸去黑皮焙

**半夏**

湯洗七次去滑各半斤

**川烏**

米泔浸軟去皮切作片焙乾用鹽四兩同炒黃色為度去鹽不用淨秤四兩

右為末薑汁和圓如梧桐子大每服五十圓空心飯飲下

**神效參苓散**

治大人小兒臟氣虛怯冷熱不調積在臟

腑作成痢疾或下鮮血或如豆汁或如魚腦或下瘀血

司方參下積熱

瀉痢

三

續鮑叢書

或下紫黑血或赤白相雜或成五色裏急後重日夜頻  
併臍腹絞痛甚不可忍及禁口疳蠱時瘟諸痢無新舊  
並能治之

肉豆蔻

去皮

茯苓

去皮各四兩

人參

去蘆

木香

白扁豆

炒各二兩

罌粟殼

去蒂

陳皮

去白各十二兩

右為末每服三大錢溫米飲調下不拘時候立見神效

**黃耆湯**治年高老人大便秘澀

綿黃耆

陳皮

去白各半兩

右為細末每服三錢用大麻仁一合爛研以水投取漿一盞去滓于銀石器內煎候有乳起即入白

蜜一大匙再煎令沸調藥末空心食前服秘甚者  
不過兩服愈常服卽無秘澀之患此藥不冷不燥  
其效如神

司方卷下 積熱

瀉痢

三 續鮑叔書



月方卷六  
秘

增廣太平惠民和劑局方卷六  
終

增廣太平惠民和劑局方卷七

眼目

**錦鵲圓**

治肝經不足風邪內乘上攻眼暗淚出怕日羞

明隱澀痒痛瞻視茫茫多見黑花或生翳膜並皆治之

甘菊花

揀淨

黃連

去鬚

防風

去蘆

細辛

去苗

杜蒺藜

牡礪

火煨取粉用

官桂

去龍皮各五兩

瞿麥

草決明

羌活

去蘆

麝仁

去皮各三兩

白茯苓

去皮四兩

蔓菁子

二升淘洗絹袋盛飯甑蒸一伏時燉

班鳩

一隻去皮毛腸嘴爪用文武火連骨炙乾

羯羊肝

一具薄批炙乾令焦

右爲末煉蜜和杵五百下圓如梧桐子大每服十五圓至二十圓以溫水或溫酒下空心日午臨卧日三服如久患內外障眼服諸藥不效者漸加服五十圓必效暴赤眼疼痛食後用荊芥湯下二十圓

**紅景圓**治肝腎俱虛眼常昏暗多見黑花或生障腎視

物不明迎風有淚久服補肝腎增目力

熟乾地黄

製

車前子

各三兩

兔絲子

酒浸別研入兩

右爲末煉蜜爲圓如梧桐子大每服三十圓溫酒下空心晚食前日二服

**蜜蒙花散**

治風氣攻注兩眼昏暗眵淚羞明臉生風粟

隱澀難開或癢或痛漸生瞖膜視物不明及久患頭疼

牽引兩眼漸覺細小昏澀隱痛并暴赤腫痛並皆治之

蜜蒙花

揀淨

石決明

微炒

羌活

去蘆

菊花

去土

杜蒺藜

炒去尖

木賊

各等分

右為細末每服一錢臘茶清調下食後日二服

**羚羊角散**

治大人小兒一切風熱毒上衝眼目暴發赤

腫或生瘡疼痛隱澀羞明

羚羊角

鎊

車前子

甘草

微炙

黃芩

川升麻

各十兩

決明子

二十兩炒

草龍膽

去蘆

山梔

取仁各五兩

右為細末每服一錢食後溫熱水調下日進三服小兒可服半錢

司方卷七

眼目

二

續鮑叢書



**秦皮散** 治大人小兒風毒赤眼腫痛癢澀眇淚昏暗羞

明

滑石

桂府者搗碎

黃連

去鬚

秦皮

各十兩

右為細末每服半錢沸湯泡去滓溫熱頻洗

**鎮肝圓**

治肝經不足內受風熱上攻眼目昏暗癢痛隱

澀難開推眇多淚怕日羞明時發腫赤或生障翳並宜

服之

決明子

炒

地膚子

遠志

去心

防風

去蘆及叉

蔓荊子

去白皮

茺蔚子

茯苓

白者去皮

人參

去蘆各一兩

青箱子

栢子仁炒

元參

甘草炙

車前子

地骨皮

山藥

柴胡去蘆

甘菊花

各半  
兩細辛去苗  
一分

右爲細末蜜水煮糊爲圓如梧桐子大  
每服二十圓用米飲下食後日二服

**菊睛圓**治肝腎不足眼目昏暗瞻視不明茫茫漠漠常

見黑花多有冷淚久服補不足強目力

甘菊花

四兩

巴戟

去心  
一兩

菴蓉

酒浸去皮炒  
切焙二兩

枸杞子

三兩

右爲細末煉蜜爲圓如梧桐子大每服三十  
圓至五十圓溫酒或鹽湯下空心食前服

司方卷七 眼目

三續鮑裝書

紹興續方

菩薩散治男子婦人風氣攻注兩目昏暗眵淚羞明臉背眶癢或時赤痛耳鳴頭眩

白蒺藜

炒

防風

剉炒

蒼朮

米泔浸一宿去皮剉炒各二兩

荊芥穗

一兩半

甘草

炙一兩

右為末不拘時入鹽少許沸湯或酒調下一大錢神效

撥雲散

治男子婦人風毒上攻眼目昏暗瞖膜遮障怕

日羞明眼多熱淚隱澀難開眶痒赤痛臉皆紅爛瘀肉侵睛但是一切風毒眼疾並皆治之

羌活

防風

甘草炒

柴胡各一斤

右爲細末每服二錢水一中盞煎至七分食後臨睡時候薄荷茶調菊花苗湯下亦得忌醃藏鮮醬濕麪及炙煨發風毒等物

**寶慶新增方**

龍膽草散治上焦受於風熱氣毒攻衝眼目暴赤躁澀羞明腫痛多眵迎風有淚腎膜攀睛胬肉隱痛並治之

又方  
見後

龍膽草

洗去土

菊花

去梗

木賊

洗去節

草決明子

微炒

甘草

炙各二兩

香附子

炒去毛

川芎

不見火各四兩

局方卷七

眼目

四

續鮑叢書



右為細末每服二錢用麥門冬熟水入砂糖少許同調食後服或米泔調或食後臨睡服

**蠟花散** 治肝經蘊熱風毒之氣內搏上攻眼目瞽膜遮

睛赤腫疼痛昏暗視物不明隱澁難開多生眵淚內外

障眼

草決明炒 甘菊花去梗 川芎不見火 蟬退洗去土

山梔子去殼 穀精草去土 防風不見火 黃芩去土

蔓荊子去皮 木賊草洗淨 羌活不見火 荊芥去梗

蜜蒙花去枝 白蒺藜炒去土 甘草各等分

右為末每服二錢用茶清調服或用荊芥湯入茶少許調服亦得食後及臨卧時服

神效新添方

治肝經不足內受風熱上攻頭目昏暗痒痛隱  
澀難開昏眩赤腫怕日羞明不能遠視迎風有淚多見

黑花

腦子

二錢半研

麝仁

去皮殼壓去油二兩

右用生蜜六錢將腦子麝仁同和每用銅筋或金  
銀釵股點大小皆時復少許滋之治連眶赤爛以油  
紙塗藥貼

眼目諸家方

流氣飲治肝經不足內受風熱上攻眼目昏暗視物不

司方卷七 眼目

五續前 敢書

明常見黑花當風多淚怕日羞明推眇赤腫隱澀難開  
或生障瞖倒睫拳毛眼眩赤爛及婦人血風眼及時行  
暴赤腫眼胞紫黑應有眼疾並宜服之

牛蒡子

炒

荊芥

去梗

木賊

去蘆

細辛

去苗

白蒺藜

去尖炒

元參

去蘆

菊花

去枝

大黃

炮

蔓荊子

去白皮

黃芩

去蘆

甘草

炙

防風

去蘆

山梔子

去皮

川芎

各一兩

草決明

一兩半

蒼朮

一兩半

右爲細末每服二錢半臨卧用冷酒調下如牙兒有患只令乳母服之

洗眼散治風毒上攻暴作赤目腫疾難開隱澀眇淚昏

暗羞明或生翳膜

山梔取仁

川芎

防風去蘆

薄荷去梗

當歸去蘆

大黃

羌活去蘆

甘草炙各二兩

右為末每服二錢冷水或熟水調下食後日三服見效

理肝氣風毒眼目赤腫昏暗羞明癰澀難開攀

睛瘀肉或痒或痛漸生翳膜及治暴赤腫痛

白蒺藜炒去尖

蟬退去頭足翅

羌活去蘆不見火

木賊草去根節各三兩

菊花去梗六兩

右為細末每服二錢食後臨卧茶清調下常服  
明利頭目洗肝去風忌發風醃藏炙燂等物

方卷七 眼目

續鮑叔書



能治外障退翳膜療風毒上攻眼疼赤腫或臉  
皆痒爛時多熱淚昏澀

赤芍藥

當歸

去蘆洗

黃連

去鬚

滑石

細研各五兩

右爲細末入研滑石拌勻每用半錢沸湯點澄  
清去滓熱洗忌一切醃藏魚鮮酒麪等毒物

續添諸局經驗秘方

無比散治大人小兒遠年近日一切風眼氣眼攻

注眼目暗昏臉生風粟或痛或痒漸生翳膜侵睛遮障

視物不明及久患偏正頭風牽搐兩眼漸漸細小連眶

赤爛及小兒瘡疹入眼白膜遮睛赤澀隱痛常服祛風

退醫明目

石決明

用鹽同東流水煮一伏時漉出研細當歸焙

川芎

羌活

各三兩

蛇脫

微炙一兩

防風

去叉枝

茯苓

去皮

甘草

各四兩

蒺藜

炒去刺半斤

蟬退

去頭足翅二兩

芍藥

赤者十兩

蒼朮

浸去皮炒十二兩

右爲細末每服三錢食後米泔調服茶清亦得忌食發風毒等物



治男子女人肝臟積熱肝虛目暗膜入水

輪漏睛眇淚眼見黑花視物不明混睛冷淚腎膜遮障

及腎臟虛憊肝受虛熱及遠年日近暴熱赤眼風毒氣

眼並治之兼治乾濕脚氣消中消渴及諸風氣等疾由  
腎氣虛敗者但服此能補肝益腎驅風明目神效

牛膝

去蘆酒  
浸三兩

生乾地黃

熟乾地黃

各洗焙  
一斤

石斛

去苗

防風

去蘆  
義

枳殼

去穢  
各四兩

杏仁

去皮尖麤炒黃  
細研去油二兩

右爲細末煉蜜爲圓如梧桐子大每服三十圓空  
心食前溫酒下或飯飲鹽湯亦得忌一切動風毒  
物等

**洗眼紫金膏**

治遠年日近腎膜遮障攀睛肉昏暗淚

多瞻視不明或風氣攻注臉生風粟或連眶赤爛怕日

羞明隱澀難開並治之

礞砂

鵬砂

乳香

各別研

赤芍藥

當歸

去苗洗各一分

雄黃

研飛二錢

麝香

別研半錢

黃連

去鬚半兩

右為末入研藥拌勻再搗煉蜜溲和為圓如皂莢子大每次用一圓安淨盞內以沸湯泡開于無風處洗藥冷閉目少時候兩三時再煨令熱依前洗一貼可洗三五次不得犯銅鐵器內洗如暴赤眼腫者不可洗之

治眼暴赤腫痛風氣熱上衝睛疼連眶臉皆

赤爛瘵肉侵睛時多熱淚及因叫怒逆損肝氣久勞瞻

視役損眼力風砂塵土入眼澀痛致成內外障翳及一



切眼疾

草龍膽

去苗

蒺藜

子去刺各六兩

茯苓

去皮四兩

菊花

去枝八兩

赤芍藥

半斤

防風

去叉

甘草

炙

羌活

各三兩

右爲末每服二錢食後臨卧時溫酒調下

**易白散**

治肝經不足受客熱風壅上攻眼目赤澀睛疼

臉爛怕日羞明夜卧多淚時行暴赤兩太陽穴疼頭旋

昏眩視物不明漸生翳膜並皆治之

赤芍藥

當歸

洗焙

黃連

去鬚各等分

右爲末每用二錢極滾湯泡乘熱重洗冷即可溫洗一日三五次洗以差爲度忌掩藏等物

**還睛圓** 治男子婦人風毒上攻眼目赤腫怕日羞明多

饒眵淚隱澀難開眶痒赤痛臉背紅爛瘀肉侵睛或患

暴赤眼睛疼不可忍者併服立效

白朮

生用

兔絲子

酒浸別研

白蒺藜

炒去刺

木賊

去節

羌活

去苗

青箱子

去生

蜜蒙花

防風

去蘆

甘草

炙各等分

右爲末煉蜜圓如彈子大每服一圓細嚼白湯下空心食前日三服又治偏正頭痛頭風頭目眩暈

**會稽散** 治一切風熱毒氣上攻兩眼多生眵淚怕日羞

明隱澀難開眶爛赤腫或痒或痛及時行暴赤眼睛昏

澀痛

曾青

四兩

蔓荊子

去皮二兩

防風

去蘆

白薑

炮各二兩

右為細末每用少許末  
搐入鼻中立有功效

秘傳羊肝圓

治丈夫婦人肝經不足風毒上攻眼目昏

暗淚出差明怕日隱澀難開或痒或痛又治遠年日近

內外翳眼攀睛胬肉箴刮不能治者此藥治之

黃連

去鬚為末

白羊子肝

淨洗去膜

右將羊肝先入沙盆內杵爛之旋入黃連末拌搗  
乾濕得所為圓如梧桐子大每服十四圓食後以  
溫漿水下連作五劑差但是諸般眼疾及障翳青  
盲者皆主之禁食猪肉及冷水○治目方用黃連

者多矣此方最為奇異劉禹錫云有崔承元者因  
官治一死罪囚而活出之囚後數年以病目致死  
一旦崔忽為內障所苦喪明踰年後半夜歎息獨  
坐時間塔除間悉宰之聲崔問為誰曰是昔所蒙  
活囚今故報恩至此遂以此方告訖而沒  
崔依此方合服不數月眼復明因傳于世

咽喉口齒

龍石散治大人小兒上膈壅毒口舌生瘡咽噎腫塞疼  
痛煩悶每用少許糝貼患處嚙津小兒瘡疹毒氣攻口  
齒先用五福化毒丹掃後仍再用此藥糝貼立效

生腦子研二錢半硃砂研飛二兩半寒水石燒通赤二斤

右為末每日三五  
次用夜卧糝貼妙



肩方卷十 咽喉口齒

**如聖湯** 治風熱毒氣上攻咽喉咽痛喉痺腫塞妨悶及

肺壅咳嗽咯唾膿血胸滿振寒咽乾不渴時出濁沫氣

息腥臭久久吐膿狀如米粥又治傷寒咽痛

**苦桔梗** 一兩 **甘草** 炒二兩

右為釐末每服二錢水一盞煎至七分  
去滓溫服小兒時時呷服食後臨卧

**鵬砂圓** 治大人小兒風壅膈熱咽喉腫痛舌頰生瘡口

乾煩渴

**腦子** 研三分 **甘草** 浸汁 **鵬砂** 研各十兩 **梅花腦** 別研一分

**麝香** 研一兩 **牙硝** 枯研二兩 **寒水石** 燒通赤五十兩

右爲末用甘草膏子和溲每兩作四百圓每服一圓含化嚙津常服化痰利膈生津止渴

**麝臍散**治牙齒搖動風虫疼痛斷肉宣露涎血臭氣常

用令牙齒堅牢解骨槽毒氣

郁李仁

二十兩

木律

四十兩

麝香空皮子

一百箇  
細剉

黃茄

二十箇  
細切

牛膝

去蘆  
十斤

已上五味搗碎入罐子內上用瓦子蓋口留一小竅用鹽泥固濟燒令通赤候烟白色卽住火取出以新土覆一伏時取出後入下項藥

細辛

去苗

升麻

各十斤

右爲細末每用少許搽患處須臾溫水漱口臨卧更貼少許嚙津亦不妨

局方卷七 眼目

上 續鮑鼓書

凡咽喉口齒

治咽喉腫痛

玉屑無憂散治咽喉腫痛舌頰生瘡風毒壅塞熱盛喉閉或因誤吞硬物諸骨鯁刺涎滿氣急或至悶亂不省人事

人事

白茯苓炒黃色

元參去蘆

貫衆去蘆

甘草

山豆根

揀去梗

黃連

縮砂

去殼

滑石

荆芥穗

各一兩

硼砂

二錢

寒水石

二兩研水飛

右為末每服一錢乾糝舌上後以新水嚥下不拘時

黃連新方

如聖勝金錠治急喉閉纏喉風飛颶單蛾雙蛾結喉重

舌木舌腮頰腫痛屢經用藥不能吞水粥者又方見後

生地黄 川芎 硫黃研 消石研

薄荷葉 川烏炮 臘茶各二兩

右為細末裂生葱自然汁澆和為錠每服先用新汲水灌漱吐出多嚼生薄荷五七葉微爛用藥一錠同嚼極爛以井水嚥下甚者連進三服即愈重舌腮腫先服一錠次以一錠安患處其病隨藥便消又治冒暑伏熱不省人事用生薄荷水調研一錠灌下即甦如行路常含一錠即無伏熱之患口舌生瘡不能合口并食熱物如上去服訖用水灌漱嚼薄荷十葉如泥吐出再水灌漱嚼藥一錠含口內聚涎裏之覺涎滿方吐出如此服三錠便能食酒醋遇食醃酸鮮脯炙煖喉中生泡須搗破吐

司方參七眼目 亡續鮑蘇書



血方省薄荷數葉以一錠同嚼并水吞下砂淋熱  
淋小便出血同車前草七葉生薑小塊研爛水調  
去滓嚼藥一錠以水送下此藥分陰陽去風熱化  
血爲涎爲水常帶隨身備急一錠可活一人命小  
兒只服半錠

厚祐新添方

**硼砂散** 治大人小兒卒患喉痺閉塞不通腫痛生瘡語  
聲不快風壅痰毒鼻衄出血

硼砂 生

甘草 各二  
十兩

山藥 六斤

腦子 七兩  
研

麝香

研 四兩

牙硝

研 二十四  
兩生

右爲細末每服  
半錢如茶點服

吳直閣增諸家名方

赴筵散治風牙蚰牙攻症疼痛晝夜不止痛不可忍睡

卧不安牙斷宜露動搖欲脫或腮頰浮腫斷爛血出

良薑

去蘆

草烏

去皮

荆芥

去梗

細辛

去土葉各二兩

右為末每用少許于痛處擦之有涎吐出不得吞  
嚥良久用溫鹽湯灌漱其痛即止常使揩牙用腐  
炭末一半相和常用止  
牙宜辟口氣永無牙疾

吹喉散

治三焦大熱口舌生瘡咽喉腫塞神思昏悶

蒲黃

二兩

盆硝

八兩

青黛

一兩半

右件用生薄荷汁一升將盆硝青黛蒲黃一處用  
瓷罐盛慢火熬令乾研細每用一字或半錢慘于

局方卷七

眼目

生

續絕錄書

口內良久涎出吞之不妨或喉中腫痛用筒子入藥半錢計川力吹之無不立效

續添諸局經驗秘方

如聖勝金鋌

治證服餌與前如聖勝金鋌同

品味小異

朴硝

四兩

硫黃

一兩半

川芎

一兩

荊芥穗

薄荷葉

嫩茶

各半兩

貫衆

二兩

古為末裂生葱自然汁澹和為鋌服藥湯使一如前方

五香散

治咽喉腫痛諸惡氣結塞不通急宜服之

雞舌香

木香

沉香

薰陸香

各一兩

麝香

別研三分

右為末入麝香研令勻每服二錢水一中盞煎至六分溫服不拘時候

**如神散**治風牙蚰牙攻症疼痛日夜不止睡臥不安或牙斷動搖連頰浮腫不拘久近皆能治之

**露蜂房**

微炙

**川椒**

去目及閉口者微炒出汗

右為末每服一錢水一盞入鹽少許同煎八分乘熱漱之冷則吐出一服立效

**王池散**治風症牙疼腫痒動搖牙齦潰爛宣露出血口

氣等疾

**當歸**

去蘆

**甘草**

炙

**川芎**

**防風**

**白芷**

**槐花**

炒

**藁本**

**地骨皮**

司方卷七 眼目

續鮑散書



細辛

去苗

升麻

各等分

右爲末每用少許指牙痛甚即取二錢水一盞半黑豆半合生薑三片煎至一盞稍溫漱口候冷吐之

荆芥湯

治風熱肺壅咽喉腫痛語聲不出或如有硬鰓物

荆芥穗

半兩

甘草

炙一兩

桔梗

二兩

右爲籠末每服四錢水一盞薑三片煎六分食後溫服

細辛散

治風虫牙疼或牙齦宣爛牙齒搖動腮頰浮腫

紅椒

縮砂仁

去殼

鶴虱

牙皂

萆撥各半兩

荊芥去梗

細辛去苗各一兩 白芷

草烏各二兩

右爲細末每用少許于痛處擦之有涎吐出不得嚥少時用溫水嗽口頻頻擦之立有神效

居方卷一  
咽喉口齒

三

增廣太平惠民和劑局方卷七終

增廣太平惠民和劑局方卷八

雜病

瘡癰萬病圖療七種癰塊五種癰病十種疰忤七種成尸十二種蠱毒五種黃病十二時瘧疾十種水病八種大風十二種癢痺并風入頭眼暗漠漠及上氣咳嗽喉中如水雞聲不得臥飲食不作肌膚五臟滯氣積聚不消壅閉不通心腹脹滿連及胃背鼓脹氣堅結流入四肢或腹叉心膈氣滿時定時發十年二十年不瘥五種下痢疳蟲蚘蟲寸白蟲諸蟲上下冷熱久積痰飲令人



多眠睡消瘦無力蔭入骨髓便成滯疾身體氣腫飲食  
嘔逆腰腳酸疼四肢沉重不能久行久立婦人因產冷  
入子臟臟中不淨或閉塞不通胞中瘀血冷滯出流不  
盡時時疼痛為患或因此斷產并小兒赤白下痢及狐  
臭耳聾鼻塞等病服此以三圓為一劑服不過三劑萬  
病悉除說無窮盡故稱萬病圓

牛黃

研細

黃芩

芫花

醋炒赤

禹餘糧

醋淬研飛

蒲黃

微炒

芎藭

人參

去蘆

紫苑

去頭蘆

雄黃

研飛

麝香

研

當歸

去蘆

桔梗

去蘆

大戟劉炒

乾薑炮

防風蘆去

黃連去鬚

硃砂飛研

犀角鎔

前胡蘆去

巴豆去皮炒心

細辛苗去

葶藶炒

肉桂去麤皮

桑白皮劉炒

茯苓皮去

芍藥

川椒去目及開口者微炒出汗

甘遂各一兩

芫青二十八枚入糯米同炒米色黃黑去頭足翅

蜈蚣十二節去頭足炙

石蜥蜴去頭尾足炙一寸

右為細末入研藥勻煉蜜為圓如小豆大若一歲已下小兒有疾者令乳母服兩小豆血出以吐利為度近病及卒病用多服積久疾病即便服常服微糖利為度卒病欲死服三圓取吐利即瘳卒中惡口噤服二圓漿一合下利即差五疰鬼刺客忤服二圓男女邪病歌哭腹大如姪身服二圓日三

局方金人雜病

二續鮑叔取書

夜一聞食服之蠱毒吐血腹痛如刺服二圖不差  
更服瘡病未發前服一圖未差更服諸有痰飲者  
服三圖冷癖服三圖日三服皆間食常令微糖利  
宿食不消服二圖取利瘕瘕積聚服二圖日三服  
拘急心腹脹滿心痛服三圖上氣嘔逆胃滿不得  
臥服二圖不差更服大痢服二圖日三服痔濕服  
二圖以一圖如杏仁大和醋二合灌下部中水病  
服三圖日再服間食服之差止人弱即隔日服頭  
痛惡寒服二圖覆取汗傷寒天行服二圖日三服  
間食服之小便不通服二圖不差明日更服大便秘  
不通服三圖又內一圖下部中即通耳聾耳內以  
綿裹如棗核塞之鼻衄服二圖癰腫了腫破腫內  
一圓如麻子大日一傳之根亦自出犯丁腫血出  
以猪脂和塗有孔內孔中差癰瘡以酢泔洗訖取  
藥和猪脂傳之漏瘡有孔以一圓內孔中和猪脂  
傳上痔瘡塗綿筋上內孔中日別易差止癰瘡以  
酢和塗上差癰瘡以布揩令汁出以酢和塗上日  
一易差止留背腰脇腫以醋和傳腫上日一易又

服二圓諸冷瘡積年不差以酢和塗之惡刺以一  
圓內瘡孔中卽差蝮蛇螫以少許內螫處若毒入  
腹心煩欲絕者服三圓蜂螫以少許傳之差婦人  
諸疾胞衣不下服二圓小兒驚癇服一圓如米許  
以塗乳令嘔之看兒大小加減小兒客忤服一圓  
如米和乳塗乳頭令嘔之以意量之蝎螫以少許  
傳之差小兒乳不消心腹脹滿服一圓如米許塗乳頭令嘔之卽差

**神應圖**

治腎經不足風冷乘之腰痛如折引背脊俛仰

不利轉側亦難或因役用過多勞傷於腎或因寢冷濕  
地氣傷腰或因墜墮傷損或因風寒客搏皆令腰痛並  
皆治之

肉桂

去麤皮

當歸

去蘆各十兩

威靈仙

去土二兩

局方卷八

雜病

三

續續鮑叔取書



右爲末以酒煮麪糊爲圓如梧桐子大每服十五圓溫酒或煎茴香湯下食前服婦人煎桂心湯下加至二十圓有孕婦人不得服忌食茗

**集效圓**

治因臟腑虛弱或多食甘肥致蛔蟲動作心腹

攪痛發作腫聚往來上下痛有休止腹中煩熱口吐涎沫卽是蛔咬宜服此藥若積年不差服之亦愈又療下部有蟲生痔痒痛

木香

不見火

鶴虱

附子

炮去皮臍

訶黎勒

煨用皮肉

蕪荑

炒研

檳榔

乾薑

炮各七兩半

大黃

剉璧炒十五兩

右爲末煉蜜爲圓如梧桐子大每服三十圓食前橘皮湯下婦人醋湯下

**乳香圓** 治諸痔下血肛邊生肉或結核腫疼或生瘡痒  
痛或大便秘難肛腸風下又治腸風下血無問新久及  
諸癰根在臟腑並能治之

芫青

去頭足翅同糯米炒以米色黃為度

枳殼

去穰麩炒

大黃

蒸

葶澄茄

牡蠣

煅火

鶴虱

炒各半兩

乳香

研

白丁香

分一

右為末以粟米糊為圓如梧桐子大每服十圓至十五圓如治腸風臘茶清下諸痔煎雞白湯下諸瘻煎鉄屑湯下並食前服

**解毒雄黃圓**

**解毒雄黃圓**

解毒治纏喉風及急喉痺卒然倒仆失音

司方金八 雜病

四 續鮑散書

不語或牙關緊急不省人事

雄黃

碎飛

鬱金

各一分

巴豆

去皮出油十四箇

右爲末醋煮麪糊爲圓如菉豆大用熱茶清下七圓吐出頑涎立便蘇省未吐再服如至死者心頭猶熱灌藥不下卽以刀尺鐵匙幹開口灌之藥下喉嚨無有不活吐瀉些小無妨及治上隔壅熱痰涎不利咽喉腫痛赤眼癰腫一切毒熱並宜服之如小兒患喉嚨赤腫及驚熱痰涎壅塞服二圓或三圓量兒大小加減

尅效餅子

治一切瘧病發作有時先覺伸欠乃作寒慄

鼓振頤頷中外皆寒腰脊俱痛寒戰旣已內外皆熱頭痛加破渴欲飲冷或痰聚胸中煩滿欲嘔或先熱後寒

或先寒後熱或寒多熱少或熱多寒少或寒熱相半或但熱不寒或但寒不熱或一日一發或隔日一發或一發後六七日再發並皆主之

龍腦

麝香

定粉

各研半兩

荷葉

熅

菜豆末

甘草

熅各五兩

硃砂

一兩一分研飛

信砒

醋煮二兩半

金箔

二十五片為衣

右為末煉蜜搜和每兩作二十九捏扁以金箔為衣每服一餅子以新汲水磨化日發者未發前服之間日者不發夜服隔數日發者前一日夜服連日者臨晨服

**烏梅丸**

臟寒蛔蟲動作上入膈中煩悶嘔吐時發時止

烏方金八雜病

五續編地黃書



得食即嘔常自吐蛔有此證謂之蛔厥此藥主之又治

久痢

烏梅

三百枚

乾薑

十兩炮

黃連

去鬚十兩

細辛

去苗

附子

炮去皮臍

肉桂

去皮

人參

去蘆

黃蘗

炙各六兩

當歸

去蘆

蜀椒

去目及閉口者微炒出汗四兩

右藥搗篩合治之以醋浸烏梅一宿去核蒸之五斗米下飯熟搗成泥和藥合相得內臼中與煉蜜杵一千下圓如梧桐子大每服十五圓溫米飲下食前服

神效散

舊名葶藶散

治十種水氣面目四肢偏身俱腫以手

按之隨手而起咳澀喘急不得安臥腹大腫脹口苦舌

乾小便赤澁大便不利

葶藶

炒香別研三兩

椒目

一兩半

黑牽牛

微炒二兩半

猪苓

去黑皮

澤瀉

各二兩

右爲細末每服以葱白三莖漿水一盞煎至半盞入酒半盞調藥三錢絕早面向東服如人行十里久以漿水葱白煮稀粥至葱爛入酒五合熱啜量人啜多少須啜一升許不得喫鹽并麪自早至午當利小便三四升或大便利喘定腫減七分隔日再服既平之後必須大將息及斷鹽房室等三年

五苓散

治下焦結熱小便黃赤淋閉疼痛或有血出及

大小便俱出血者亦宜服之

瞿麥穗

一兩

甘草

三分

山梔子

去皮炒半兩

局方卷八 雜病

續鮑叔散書

右爲末每服五錢至七錢水一椀入蓮鬚葱白七莖燈心五十莖生薑五七片同煎至七分時時溫服不拘時

**必勝散**

治男子婦人血妄流溢吐血衄血嘔血咯血

人參

去蘆

蒲黃

微炒

小薊

并根用

熟乾地黃

當歸

去蘆

烏梅

去核

芎藭

各一兩

右爲粗散每服五錢水一盞半煎七分溫服不拘時候

**御腸圓**

治久新諸痔肛邊腫痛或生瘡痒時有膿血又

治腸風下血及肛門脫出並宜服之

天南星

生

白礬

枯

綠礬

枯

訶子

煨去核

白附子

生用

附子

生去支臍

枳殼

去穢炒

半夏

生各二兩

雞冠花

微炒五兩

栝樓

二枚存性

蝟皮

兩個剉碎礮內燒存性

右爲末以醋煮麴糊圓如梧桐子大每服二十九空心臨臥溫酒下遠年不差者服十日見效久服永除根本小可腸風等疾一二年內者十服瘥永不發動

**石韋散**

治腎氣不足膀胱有熱水道不通淋瀝不宣出

少起數臍腹急痛蓄作有時勞倦卽發或尿如豆汁或便出砂石並皆治之

木通

剉

石韋

去毛各二兩

滑石

白朮

瞿麥

芍藥

葵子

各三兩

當歸

去廬

司方金入雜病

七續鮑散書



甘草

炙

王不留行

各一兩

右爲細末每服二錢小麥湯調下食前日二三服

**杜蘅散**

治諸虛不足及新病暴虛津液不固體常自汗

夜臥即甚久而不止羸瘠枯瘦心忪驚惕短氣煩倦

麻黃根

洗淨

黃蘗

去苗土

牡蠣

米泔浸刷去土火燒通赤各一兩

右爲麤散每服三錢水一盞半小麥百餘粒同煎至八分去滓熱服日二服不拘時候

**法製熟艾主灸百病**

陳久黃艾

不拘多少擇取葉入臼內用木杵輕搗令熟以細篩隔去青滓再搗再篩如此三次

別以馬尾繮子隔之更再搗羅候柔細黃熟爲度

右主灸百病世人著灸多無法度徒忍痛楚罕能愈疾今於聖惠千金外臺等方內撫取點穴分寸作炷大小壯數多少等分如前

### 定分寸法

取病人男左女右中指第二節內度兩橫紋相去爲一寸應取穴及作炷分寸並依

此法

### 點灸穴法

凡點穴時須得身體平直四肢毋令拳縮坐點毋令俯仰立點毋令傾側灸時孔穴

不正無益於事徒燒肌肉虛忍痛楚若坐點則坐灸之臥點則臥灸之立點則立灸之反此亦不得其穴

### 作艾炷法

卽下火點灸須令艾炷根下廣三分長亦三分苦減此不覆孔穴不中經脉火氣不

行亦不能除病強壯人亦可稍增令大周歲已內小兒可如小麥大

高方參八雜病

八續鮑叢書

點火法

古來用火灸病忌八般木火今即不用木火灸又不犯諸患兼去久病以清油點燈燈上

燒艾莖點灸兼滋潤灸瘡至愈已來且無疼痛用蠟燭更佳又火珠耀日以艾承之遂得火出此火

灸病為良次有火照耀日以艾引之便得火出此火亦佳

下火灸時法

當以日正午以後乃可下火灸之時謂陰氣未至灸無不著午前平旦穀氣虛

令人顛眩不可臥灸慎之慎之其大法如此卒急者不可用此例若遇陰霧大起風雪忽降猛雨炎

暑雷電虹霓暫時且停候待清明即再下火灸炎時不得傷飽太飢飲酒食生硬物兼忌思慮憂愁

怒呼罵叫吁嗟歎息一切不祥忌之大吉

治灸瘡不發法

凡著灸療病歷春夏秋冬不較者灸炷雖然數足得瘡發膿所患即差如

不得瘡發膿出其瘡不愈甲乙經云灸瘡不發者用故履底灸令熱熨之三月即發膿出自然愈疾

今用赤皮葱三五莖去其葱青於塘灰火中煨熟  
拍破熟熨灸瘡十餘徧其瘡三日自發立壞膿出  
愈疾

### 淋洗灸瘡法

凡著灸治病纔住火便用赤皮葱薄荷

二味煎湯溫淋洗灸瘡週迴約一二  
寸已來身驅逐風氣於瘡口內出兼令經脈往來  
不滯於瘡下自然瘡壞疾愈若灸瘡退火加後用  
桃樹東南枝梢青嫩桃皮二味等分煎湯溫淋  
洗灸瘡此二味偏能護灸瘡中諸風若瘡內黑爛  
清者加胡荽三味等分煎湯溫淋洗灸瘡自然  
生好肉也若灸瘡疼痛不可忍多時不較者加黃  
連四味等分煎湯  
淋洗立有神效

### 壯數多少法

千金方云凡言壯數者若丁壯遇疾病

弱者可復減半依扁鵲灸法有至  
五百壯于壯者皆臨時消息之

局方卷八 雜病

續集散書



推人神所在法

一日足大指二日外踝三日股內四日腰五日口舌懸嚨六日足小指七日內踝八日足腕九日尻十日背腰十一日鼻柱

十二日髮際十三日牙齒十四日胃脘十五日偏身十六日胷乳十七日氣衝十八日腹內十九日足趺二十日膝下二十一日手小指二十二日伏

兔二十三日肝俞二十四日手陽明二十五日足陽明二十六日手足關元下至足已上人神

十九日膝脛三十日關元下至足已上人神所在之日禁忌著灸若遇病急切不拘此例

所在之日禁忌著灸若遇病急切不拘此例

紹興續添方

常山飲治瘧疾凡瘧疾蓋因外邪客於風府生冷之物

內傷脾胃或先寒後熱或先熱後寒或寒熱獨作或連

日併發或間日一發寒則肢體顫掉熱則舉身如燒頭

痛惡心煩渴引飲氣息喘急口苦咽乾脊脊酸疼腸鳴  
腹痛諸藥不治漸成勞瘵者此藥治之

良薑 二十兩 烏梅 去仁一斤 知母 川常山 酒炒

甘草 炙 草菓 各二斤

右為粗散每服三錢水一盞生薑五片棗一枚煎至七分去滓溫服

對金飲子 治證并方並見傷寒類 清心蓮子飲 治證并方並見痢冷類

寶慶新增方

槐角圓 治五種腸風瀉血糞前有血名外痔糞後有血名內痔大腸不收名脫肛穀道四面瘻肉如奶名舉痔

司方卷八 雜病

上續鮑氏散書

頭上有孔名癰並皆治之

槐角

去枝梗炒一兩

枳殼

去穢炒

黃芩

各半斤

當歸

酒浸一宿

防風

去蘆

地榆

各八兩

右為末酒糊圓如梧桐子大每服三十圓米飲下不拘時候此藥治腸風瘡內有蟲裏急下膿血止痒痛消腫聚驅濕毒久服永除病源

**導祐新派方**

**腸風黑散**

治證與瀉痢類腸風黑散同

荊芥

二兩燒

亂髮

槐花

槐角

各燒一兩

甘草

炙

蜎皮

各一兩半

枳殼

去穢燒一兩炒

右將合燒藥同入磁瓶內黃泥固濟燒存三分性  
出火毒同甘草根殼搗羅爲末每服二錢水一盞  
煎至七分空心溫服  
或溫酒調服亦得

神應黑玉丹治證并方見瀉痢類

吳直閣贈者家方

備急圓療心腹諸卒暴百病中惡客忤心腹脹滿卒痛  
如刀所刺氣急口噤

乾薑

炮一兩

巴豆

去皮油

大黃

各二兩

右件爲末煉蜜爲圓如梧桐子  
大每服三圓溫水下不拘時

青解毒圓治大人小兒五臟積熱毒氣上攻胃膈煩悶

司方參入雜病

七續鮑散書



咽喉腫痛赤眼癰腫頭面發熱唇口乾燥兩頰生瘡精  
神恍惚心忪悶亂坐臥不寧及傷暑毒面赤身熱心躁  
渴飲食不下

寒水石

研

石膏

研各二

青黛

八兩

右件細研如粉入青黛和勻蒸餅七箇水調爲圓  
如雞頭大每服一圓食後新汲水化下或細嚼用  
生薑水下亦得如中諸毒並宜服之及小兒驚風  
潮熱痰涎壅塞心胃煩躁煩赤多渴睡臥不穩每  
三歲兒可服半粒更  
量歲數加減與之

寸金圓

治元陽虛弱寒氣攻衝膀胱小腸發腫作痛或

在心脇牽連小腹連屬陰間致身體增寒撮痛

當歸去蘆酒浸一宿一兩半 楮實子一兩半 川楝子燒一兩半

巴豆炒七箇 全蝎炒四箇

右爲細末用浸當歸酒打麵糊和圓如雞頭實大空心溫酒鹽湯吞下二圓至三圓併進二服

**奪命丹** 治遠年日近小腸疝氣偏墜摘疼臍下撮痛以

致悶亂及外腎腫硬月漸滋長陰間濕痒抓成瘡

吳茱萸去枝梗一斤四兩用酒浸四兩用醋浸四兩用湯四兩用童子小便浸各浸一宿同焙

乾澤瀉去灰土二兩

右爲細末酒煮麵糊圓如梧桐子大每服五十圓空心食前鹽湯或酒吞下

**續命諸局經驗秘方**

局方卷八 雜病

續命諸局經驗秘方

素真內治圓

治腎經虛弱膀胱為邪氣所搏結成寒疝

陰癰偏大上攻臍腹痛病膚囊腫脹或生瘡瘍時出黃水腰腿沈重足脛腫滿行步艱辛服之內消不動臟腑

一方無枳實陳皮桃仁  
延胡索川楝子木香

山茱萸

搗去核取肉微炒

桔梗

水浸一伏時漚出慢火炒乾為度

白蒺藜

炒去刺

川烏

炮去皮臍

肉桂

去粗皮

食茱萸

吳茱萸

微炒

茴香

船上者淘去沙石焙炒

青皮

去白各二兩

海藻

洗焙

五味子

淨洗

大腹皮

酒洗焙

延胡索

各二兩半

枳實

去穢炒

桃仁

去皮尖及雙仁麩炒別研

陳皮

去白各一兩

川楝子

劉炒三兩

木香

一兩半

右爲末酒糊圓如梧桐子大溫酒下三十圓食前服

**麝香大戟圓**

治陰癰腫脹或小腸氣痛

胡蘆巴

炒四兩

大戟

去皮炒黃半兩

麝香

別研一錢

茴香

船上者

川楝子

各六兩

檳榔

刮去底細切不見火

附子

炮去皮臍

訶子

炮去核酒浸蒸焙乾用

木香

各一兩

右爲末獨留川楝子以好酒一二升葱白七枚長三四寸煮川楝子軟去核取肉和藥搗杵圓如梧桐子大空心溫酒下五七圓至十圓薑湯亦得潮發疼痛炒薑熱酒下十五圓

**白朮**

治膀胱蘊熱風濕相乘陰囊腫脹大小便不利

司方卷八 雜病

三續鮑氏藏書



白牽牛

二兩

桑白皮

微炒

白朮

木通

去節

陳皮

去白各半兩

右搗為細末每服二錢薑湯調下空心服未覺再進常服導利留滯不損臟氣

**胡蘆巴圓**

治大人小兒小腸氣蟠腸氣奔豚氣疝氣偏

墜陰腫小腹如卵上下痛不可忍或絞結繞臍攻刺嘔

惡悶亂並治之

胡蘆巴

炒一斤

吳茱萸

湯洗七次炒十兩

川楝子

炒一斤二兩

大巴戟

去心炒

川烏

炮去皮各六兩

茴香

去土炒十二兩

右為細末酒煮麴糊為圓如梧桐子大每服十五圓空心溫酒吞下小兒五圓茴香湯下

治瘡腫傷折

雲母膏治一切瘡腫傷折等病

蜀椒

去目及閉口者微炒出汗

白芷

沒藥

研

赤芍藥

肉桂去粗皮

當歸

鹽花

研

麒麟竭

研

菖蒲

白芨

芎藭

草龍膽

木香

白斂

防風

去蘆又

厚朴

去麤皮薑汁製

麝香

研

桔梗

柴胡

去蘆頭

松脂

人參

蒼朮

泔浸一宿

黃芩

夜合

用皮

乳香

附子

去皮臍

茯苓

去皮

古今金匱雜病

古今續編

高良薑

各半兩

消石

研如粉

甘草

各四兩

桑白皮

水銀

候膏凝如人體熱以生絹袋盛水銀以手彈如針頭大鋪在膏上謂之養藥母

柏葉

道者不近

槐枝

柳枝

各二兩

陳皮

兩

雲母

光明白薄白研粉四兩

清油

四十兩

黃丹

細研十兩

黃芩

去鹽半兩

石除雲母消石麒麟竭沒藥麝香乳香黃丹薑花八味別研外並剉如豆大用上好清油於瓷器中浸听剉藥七日以物封閉後用文火煎不住手攪三上火三下火每上候匝固沸乃下火候沸定而上如此三次候白芷附子之類黃色為度勿令焦黑以綿或新布絞去滓卻入鐺中再上火熬後下黃丹與別研藥八味以柳篋不住手攪直至膏凝良久色變再上熬仍滴少許水中凝結不粘手為

度先炙一器熱卽傾藥在內候如人體溫熱彈  
水銀在上每用膏藥卽先刮去水銀治發背先以  
敗蒲一斤用水三升煎五十沸如人體溫將蒲水  
洗瘡拭乾貼藥一兩分爲三服溫酒下未成膿者  
立差於外貼之如瘡外貼癰瘰骨疽毒穿至骨用  
藥一兩分作三服溫酒下甚者卽爲出惡物兼外  
貼差腸癰以藥半兩分爲五服甘草湯下未成膿  
者當時消已有膿者隨藥下膿出後每日酒下五  
圓如梧桐子大待膿止卽住服風眼貼兩太陽穴  
壁鏡咬蜘蛛咬外貼留瘡口發腦發鬚發眉發  
耳癰癰牙瘡牙疼並外貼包裹卽當時痛止箭頭  
所傷箭頭在內外貼每日吃少許爛菜豆箭頭自  
出虎豹所傷先以甘草湯洗然後貼膏每日換不  
過三次貼狗蛇咬生油下十圓如梧桐子大仍須  
貼外難產三日不分晚溫酒下一分便生血暈欲  
死以薑汁和小便半升溫酒下十圓死者卽返死  
胎在腹以榆白皮湯下半兩便生丈夫本穢氣茴  
香溫酒下一分每日一服不過二服差中毒藥酒



洗襪溫下一分每日一服不過四度瀉出惡物差  
痛贅外貼消之一切腫癰外貼立差但有所苦並  
皆貼之藥到即差已上主療只忌羊血餘無所忌  
如人收此藥防身以蠟紙裹不令風乾可三十年  
不損藥力

**小犀角圓**治腸癰乳癰發背一切毒腫服之化為水

巴豆二十二枚去皮膜

大黃蒸焙一分犀角三兩

黃連去鬚梔子去皮

乾蓼藍升麻

黃芩防風去蘆

人參當歸去蘆

黃芪去苗甘草炙各一兩

右為細末入巴豆勻煉蜜洩和為圓如梧桐子大  
每服三圓溫湯下利三兩行喫冷粥止之不利加

至四五圓初服取快利後漸減圓數取微瀉世為  
度老小以意加減腫消及和潤乃止利下黃水覺  
腫處微皺色變即是消候一切腫毒皆內消神驗  
不可論忌熱麪蒜猪肉蘆笋魚海藻菰菜生冷粘  
食

**何首烏散**治脾肺風毒攻衝徧身癰疥瘙痒或生癰疹

搔之成瘡肩背拘倦肌肉頑痺手足皴裂風氣上攻頭

面生瘡及治紫癍白癍頑麻等風

荆芥穗

蔓荊子

去白皮

蚬蛻草

去上

威靈仙

洗淨

何首烏

防風

去蘆叉

甘草

炙

右件各五斤搗羅為末每服一  
錢食後溫酒調下沸湯亦得

易方參入雜病

續鮑鑑書

太醫活命丹

治男子婦人外傷內損狗咬蟲傷驢撲馬

肩力卷六 瘡腫傷折

墜手足傷折一切疼痛腹中瘀血刺脇築心及左癱右  
緩走疼痛癰腫痔漏婦人冷氣入腹血脈不通產後  
敗血灌注四肢吹妳腫痛血氣撮痛並宜服之

亂髮

皂角水淨洗二斤曬乾用清麻油二斤入鍋內  
炒頻以手攪看脆亂如糊答即止不可令炒過

栗楔

謂栗三顆共一坭其中區  
薄者是去殼薄切口乾

皂角刺

燒通紅米醋內淬焙

大黑豆

以濕布拭去塵垢退黑皮焙乾

花桑枝

如臂大者炭火燒烟盡  
米醋淬取出焙各一斤

草麻仁

別研塗墨三兩

乳香

好者細研入米醋一  
碗熬令香熟四兩

硃砂

光淨者醋化  
塗墨上二兩

細墨

半斤一牛用草麻仁三兩乳鉢爛研塗墨上塗

令通紅放地上盆蓋出火氣兩飯久

一半用硃砂二兩醋化塗墨上炙乾

右六味為末入乳香膏內和杵三千下圓如彈子

大如乳香膏少更入醋煮凝糊痛甚者每服一圓

輕可者服半圓用無灰酒一盞乳香一豆大先磨

香盡次磨藥盡煎三五沸臨臥溫服以痛處就床

臥如欲出汁以衣被蓋覆仍用藥塗磨損處忌一

切動風有應婦人諸疾服者更用當歸末一錢依

法煎服有孕者莫服

三龍膏

摩風止痛消腫化毒治一切傷折瘡腫

枯婁

大者一箇去皮

黃蠟

一兩半

白芷

淨揀剉半兩

麻油

清真者六兩

麝香

研一錢

松脂

研一錢半

零香

藿香

各一兩

司方卷八雜病

七續鮑叔散書



后乃卷八瘡腫傷折

杏仁去皮尖

升麻

黃芪

赤芍藥

白芨

白斂

甘草淨揀剉各一分

右以油浸七日卻濾出油先煉令香熟放冷入諸藥慢火煎黃色用絹濾去滓入銀石鍋內入蠟并麝香松脂熬少時以養合器盛每用少許薄攤絹帛上貼若頭面風癰痒瘡腫疼痛並塗磨令熱頻用之如耳鼻中肉絲用紙捻子每日點之至一月即愈如治灸瘡及小兒瘤瘡塗之兼滅癍痕神效

紹興續添方

化毒排膿內補十宣散

亦名托裏十補散

治一切癰疽瘡癤未

成者速散已成者速潰敗膿自出無用手擠惡肉自去

不犯刀仗服藥後疼痛頓減其效如神

黃芪

以綿上來者為勝半如箭簾長二三尺頭不叉者洗淨寸截破絲壁以鹽湯潤透用蓋盛蓋

湯鍋上炊久焙燥隨

眾藥入研成細末

人參

以新羅者擇團結重實滋潤者洗淨去蘆

薄切

焙乾

川當歸

溫水洗薄切焙乾各二兩

厚朴

梓開者去粗皮

切薑汁晷一

宿燼熟焙燥

桔梗

以有心味苦者為真洗淨去頭尾薄切焙燥

桂心

用卷薄者別研不見火

芎藭

以川中來者為上今多用撫芎大塊者淨

洗切

焙

甘草

川白芷

各一兩

防風

擇新香者淨洗

切焙一兩

右十味選藥貴精皆取淨晒焙極燥方秤除桂心外一處搗羅為細末入桂令勻每服白三錢加至

局方卷八 雜病

續鮑散書

五六月  
瘡腫傷折

五六錢熱酒調下日夜各數服以多為妙服至瘡  
日合更服尤佳所以補前損杜後患也不飲酒人  
濃煎木香湯下然不若酒力之勝也或飲酒不多  
能勉強閒用酒調并以木香湯解酒功效當不減  
於酒也大抵瘡疽之作皆血氣凝滯風毒壅結所  
致治之不早則外壞肌肉內攻臟腑其害甚大纔  
覺便服倍加服數服之醉則其效尤速發散風毒  
流行經絡排膿止痛生肌長肉藥性平和老人小  
兒婦女室女皆可服之

**沒藥降聖丹**

治打撲閃肭筋斷骨折攣急疼痛不能屈

伸及榮衛虛弱外受遊風內傷經絡筋骨緩緩皮肉刺

痛肩背拘急身體倦怠四肢少力

**自然銅**

火煨醋淬十二次  
研為末水飛過焙

**川烏頭**

生去皮臍

**骨碎補**

煨去毛

白芍藥

沒藥研別

乳香研別

當歸洗焙各一兩

生乾地黄

川芎各一兩

右並生用爲細末以生薑自然汁與蜜等分煉熟和圓每一兩作四圓每服一圓搥碎水酒各半盞入蘇木少許同煎至八分去蘇木熱服空心食前

寶慶新方

千金漏蘆湯治癰疽發背丹毒惡腫時行熱毒發作赤

色瘰癧初發頭目赤痛暴生障翳吹妳腫痛一切無名

惡瘡雖覺所苦細微不可輕慢急服此藥並皆內消更

不成膿若發背癰疽已成膿者當排日服之直至膿盡

司方卷八 雜病

七 續編鮑氏散書



漏蘆

去蘆

麻黃

去節

升麻

剉

赤芍藥

生剉

黃芩

去皮

甘草

生剉

白斂

淨洗

白芨

去鬚

枳殼

米泔浸一宿去白各四兩

生大黃

十三兩

右咬咀每服四錢水二盞煎至一盞紗帛濾去滓空心食前熱服以快利爲度病人更自量增損服之立效

**消肌散** 治風邪客於肌中渾身瘙痒致生瘡疥及脾肺

風毒攻衝徧身瘡疥皴裂乾濕發瘡日久不瘥並皆治

之

翦草

七兩不見火

輕粉

一錢

右爲細末瘡濕用藥乾糝  
瘡乾用麻油調藥傳之

**神效托裏散**治癰疽發背腸癰妳癰無名腫毒焮作疼

痛增寒壯熱類若傷寒不問老幼虛人並皆治之

**忍冬草**去梗**黃芪**去蘆各五兩**當歸**一兩二錢**甘草**炙八錢

右爲細末每服二錢酒一盞半煎至一盞若病在  
上食後服病在下食前服少頃再進第二服留滓  
外傳未成膿者內  
消已成膿者卽潰

**厚和新添方**

**紅玉散**斂瘡口生肌肉止疼痛去惡水不問日近年深

並治之

司方金入雜病

二編續編補遺

寒水石

炭火烘通赤候冷細研二兩

黃丹

半兩

右同研細乾煖瘡口內後用萬金膏貼之每日一上或再上尤妙

萬金膏治癰疽發背諸瘡癰從高墜墮打撲傷損腳膝

生瘡遠年癰瘡五般痔漏一切惡瘡並皆治之

龍骨

鼈甲

苦參

烏賊魚骨

黃蘗

草烏頭

黃連

猪牙皂角

黃芩

白斂

白芨

木鼈子仁

當歸

洗焙

厚朴

去粗皮

川芎

香白芷

沒藥

研別

槐枝

柳枝

並同劉研各一分

乳香

別研一錢

黃丹

一兩半

清麻油

四兩冬月用半斤

右除黃丹外銀石器中將諸藥於油內慢火煎紫赤色去藥不用却入黃丹一半放油內不住手攪令微黑更入餘黃丹不住手攪須是慢火熬令紫黑滴在水上不散及不粘手然後更別入黃丹少許再熬數沸如硬時卻更入油些小以不粘手為度用時量瘡大小攤紙上貼之

吳直閣增諸家名方

接骨散

治從高墜下馬逐傷折筋斷骨碎痛不可忍接

骨續筋止痛活血

定粉

當歸

各一錢

鵬砂

一錢半

右為細末每服二錢煎蘇木湯調下服訖後時時吃蘇木湯

司方參入雜病

三續鮑截書



肩入各入瘡腫傷折

**急風散** 治久新諸瘡破傷中風項強背直腰為反折口

噤不語手足抽掣眼目上視喉中沸聲

丹砂

一兩

草烏頭

三兩一牛生用一半以火燒存性於米醋內淬令冷

麝香

研

生烏豆

同草烏一處為末各一分

右為細末和勻破傷風以酒一小盞調半錢神效如箭頭先用酒一盞調服半錢卻以藥貼箭瘡上

**油調立效散** 治濕疥侵淫流漬徧體大作癩癧搔之水

出小如粟粒痒痛難任肌膚濕潤經久不差

膩粉

綠礬

黃蘗

微炙細研

硫黃

研細各等分

右為細末研勻以生油調藥塗之

**導滯散** 治重物壓迫或從高墜下作熱五內吐血下血

出不禁止或瘀血在內胃腹脹滿喘急氣短

當歸

大黃

右等分炒為末每二錢  
溫酒調下不計時候

**拔毒散** 治小兒丹毒肉色變異或著四肢或在胃背遊

走不定焮熱疼痛拔毒消腫散熱定疼

石膏

三兩

甘草

黃蘗

各一兩

寒水石

七兩

右為細末每用水調時復以雞翎刷掃以芭蕉自然汁調藥妙

**琥珀散** 治頸項癰癰及發腋下初如梅子腫結硬強漸

局方卷八 雜病

三續鮑林叔書

肩刀名入瘡腫傷折

若連珠不消不潰或穿穴膿潰肌汁不絕經久難差漸

成癰疾並治之

琥珀一兩

木通

桂心

當歸

白芷

防風

松脂

硃砂

研

木鼈

去殼各半兩

麻油

斤二

丁香

木香

各三分

右件藥先用琥珀丁香桂心硃砂木香五味搗羅為末其餘藥並細判以油浸一宿於鍋中以慢火煎候白芷焦黃漉出次下松脂末濾去滓再澄清油卻安鍋中慢火熬下黃丹一斤以柳木篦不住手攪令黑色滴入水中成珠子不散看硬軟得所入琥珀等末攪令勻於瓷器內盛之每使時看大小用火煖紙上勻攤貼之

**丹參膏** 治乳腫乳癰毒氣燉作赤熱漸成攻刺疼痛及

治乳核結硬不消散通順經絡宣導壅滯

丹參

赤芍藥

白芷

各等分

右細剉以酒淹三宿入豬脂半斤微煎令白芷黃色濾去滓入黃蠟一兩每用少許時時塗之

**神效當歸膏** 治湯火傷初起癰漿熱毒侵展焮赤疼痛

毒氣壅盛腐化成腫斂瘡口生肌肉拔熱毒止疼痛

當歸

黃蠟

各一兩

麻油

四兩

右件先將油煎令當歸焦黑去滓次入蠟急攪之放冷入蠟合內每使時以故帛子攤貼

**烏蛇膏** 治風邪毒氣外客皮膚薰發成腫所起不定遊

方集 雜病

續編 散膏



走往來時發痒痛或風毒勢盛攻注成瘡焮赤多膿瘡  
邊緊急但是風腫並皆治之

肩乃名入瘡腫傷折

三

吳茱萸

藁本

獨活

細辛

白僵蠶

去絲嘴炒

半夏

漢椒

去目炒

防風

赤芍藥

當歸

桂心

川芎

香白芷

各半兩

烏蛇

黃蠟

各二兩

乾蝎

附子

去皮尖各一兩

右件細剉以煉臘月猪脂二斤文火煎候白芷赤  
黑色爲度綿濾去滓下蠟入瓷器內盛每用取少  
許摩之令  
熱日三服

神仙太一膏治八發癰疽一切惡瘡軟癰不問年月深  
遠已成膿未成膿貼之卽效蛇虎蝎犬湯火刀斧所傷  
並可內服外貼發背先以溫水洗瘡拭乾用帛子攤藥  
貼仍用水下血氣木通酒下赤白帶下當歸酒下咳嗽  
喉閉纏喉風並縣裏含化一切風赤眼貼太陽穴後用  
山梔子湯下打撲傷損貼藥仍用橘皮湯下腰膝痛貼  
之鹽湯下唾血桑白皮湯下諸漏先以鹽湯洗其諸瘡  
瘡並量大小以紙攤藥貼之並每服一粒旋圓櫻桃大  
以蛤粉爲衣其藥可收十年不壞愈久愈烈神效不可

具述

肩刀外入瘡腫傷折

元參

白芷

川當歸去蘆

肉桂去麝皮

大黃

赤芍藥

生乾地黃各一兩

右剉用麻油二斤浸春五日夏三日秋七日冬十日  
瀉去滓油熬得所次下黃丹一斤以滴油在水  
中不散為度

續添諸局經驗秘方

補損膏歸散療墜馬落車被打傷腕折臂呼叫不絕服

此藥呼吸之間不復大痛服三日筋骨即當相連神效

忌冷水

澤蘭製

附子

炮去皮各一分 當歸

蜀椒

炒去汗

甘草炙

桂心

各三分

芎藭

炒六分

右爲細末每服二錢溫酒調下日三服忌海藻菰菜葱猪

**排膿托裏散**

治一切瘡癰癰毒及腸癰或赤腫而未破

或已破而膿血不散渾身發熱疼痛不可堪忍者并治

婦人疔癰一切毒腫並宜服之

地蜈蚣

赤芍藥

當歸

甘草

各等分

右爲細末每服二錢溫酒調下不拘時候

**升麻和氣飲**

治瘡疥發於四肢臀髀痛痒不常甚至增

司方卷八 雜病

痘續鮑藪書



寒發熱攻刺疼痛浸淫浮腫又癩風入臟陰下濕痒耳  
鳴眼痛皆治之

乾薑

熟枳殼

各半錢

乾葛

熟蒼朮

桔梗

升麻

各一兩

當歸

熟半夏

茯苓

白芷

各二錢

陳皮

甘草

各一兩半

芍藥

七錢半

大黃

蒸半兩

右為剉散每服四大錢水一盞半薑三片燈心十五莖煎至七分去滓食前服

五香連翹湯

治一切惡核瘰癧癰疽惡腫等病

出三因方

沈香

不見火

舶上青木香

乳香

不見火

甘草生各一分

連翹去蒂

射干

升麻

桑寄生

如無以升麻代之

獨活

今鋪家所賣者只是宿前胡或是生當歸

不堪用只用羌活甚妙

木通

去節各三分

丁香

不見火牛兩

大黃

蒸三雨

麝香

真者別研一錢半

右投咀每服四大錢水二盞煮取一盞以上去滓服八分清汁空心熱服半日以上未利再吃一服以利下惡物為度未生肉前服不妨以折去熱毒之氣本方有竹瀝芒硝恐泥者不能斟酌故關之智者當自添減

**五香連翹湯**

方甚多當以三因為正李氏方併存之

李氏用乳香甘草木香沉香連翹射干升麻木通桑寄生獨活各三分丁香半兩大便秘者加大黃三分李氏所以不用大黃者蓋恐虛人老人

方金入瘡腫傷折

續鮑散書

不宜服故臨  
時加減耳

又一方青木香三分桑寄生二分沈香木通生黃  
芪大黃各一兩酒浸煨麝香二錢乳香藿香川升  
麻連翹各半兩雞舌香三分此方與三  
因李氏方同但多加雞舌香藿香耳

